



titolo	classe	sottoclasse	categoria
1	4	2	2

atti n. 8646/2019

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE (CAT. D): PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

La Commissione rileva che per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si deve fare riferimento agli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/01, e che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 15 punti per i titoli di carriera;
- 2 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- 10 punti per curriculum formativo e professionale.

Il superamento della prova scritta e l'ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell'ambito dell'unica seduta prevista, è in ogni caso subordinata all'avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l'aver sostenuto la prova pratica

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20 nella prova pratica.

L'idoneità alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

Ai fini della graduatoria il punteggio conseguito in ciascuna prova di esame sarà sommato a quello riportato nella valutazione dei titoli, il totale così ottenuto rappresenterà la votazione complessiva di ogni candidato.

Il giorno venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 07.30 presso il PalaDesio - (PalaBancoDesio) Palazzetto dello Sport della Città di Desio situato in Largo Atleti Azzurri D'Italia, 20832 Desio (MB) - si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D), indetto con deliberazione n. 303 del 9 maggio 2019.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 600 del 26 agosto 2020, atti n. 8646/2019, è così composta e ritualmente convocata:

dott. Gianfranco Galli	Dirigente Responsabile SITRA Presidente titolare;
dott.ssa Francesca Marrone	Collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D Componente titolare;
dott.ssa Giuliana Pieraccini	Collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere – cat. Ds Componente titolare;
dott.ssa Martina Santambrogio	Assistente amministrativo – cat. C Segretario della Commissione.

I testi e criteri di valutazione delle prove concorsuali, sono i seguenti:

PROVA SCRITTA

La commissione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 220/2001 e di quanto indicato sul bando concorsuale - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27 settembre 2019 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, stabilisce che la prova scritta verrà formulata *“su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla”*.

La prova scritta è segreta, quindi il candidato non dovrà firmarla, non dovrà indicarvi i propri dati identificativi né alcun segno che possa essere ritenuto motivo di riconoscimento (modulo risposte); per lo stesso motivo si dovrà usare esclusivamente la biro fornita.

La Commissione ha predisposto una terna di prove costituita da 3 test a risposta multipla.

Ogni test è composto da 30 domande. Alcune domande possono essere presenti, in diverso ordine, in tutti e tre i test. Ciascuna domanda è corredata da 4 possibili risposte.

Tenuto conto che il punteggio per la valutazione della prova scritta, come previsto dal, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, è in trentesimi e che per il conseguimento dell'idoneità il **punteggio** minimo è di 21 punti su 30, la commissione stabilisce di valutare le prove con il seguente criterio:

la soglia minima per il raggiungimento dell'idoneità sarà di 21 risposte esatte pari a 21 punti; ad ogni ulteriore risposta corretta verrà attribuito 1 punto fino a raggiungere il massimo di 30, secondo lo schema sottostante:

Risposte esatte	Punteggio su 30
21	21
22	22
23	23

24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30

I quesiti senza risposta e le risposte errate non comportano detrazione di punteggio, il loro valore quindi è zero.

I tre test, tra cui è stato estratto quello che ha costituito l'oggetto d'esame uguale per tutti, sono i seguenti:

PROVA SCRITTA A

(allegata prova scritta A + griglia correzione prova scritta A- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA SCRITTA B

(allegata prova scritta B + griglia correzione prova scritta B- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA SCRITTA C

(allegata prova scritta C + griglia correzione prova scritta C- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

La prova estratta dai candidati dott. Mannone Alessio e dott.ssa Lopoli Chiara è la prova scritta - questionario "B". L'elaborato estratto viene fatto firmare da entrambi i candidati che hanno estratto le prove, avendo cura che gli stessi non possano prendere visione delle domande ivi riportate.

Vengono aperte anche le buste "A" e "C" contenenti le prove non estratte (anch'esse sottoscritte dai candidati dott. Mannone Alessio e dott.ssa Lopoli Chiara).

PROVA PRATICA

La commissione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 220/2001 e del bando del concorso pubblico, stabilisce che la prova pratica consisterà *"nella esecuzione di tecniche specifiche, nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta o soluzione di quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla vertenti su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso"*.

Vengono predisposte all'unanimità le seguenti tre prove pratiche tra cui verrà estratta quella che costituirà l'oggetto dell'esame uguale per tutti i candidati.

Ogni **test è composto da 20 domande**. Alcune domande possono essere presenti, in diverso ordine, in tutti e tre i test. Ciascuna domanda è corredata da 4 possibili risposte.

Tenuto conto che il punteggio per la valutazione della prova pratica, come previsto dal, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, è in ventesimi e che per il conseguimento dell'idoneità il **punteggio** minimo è di 14 punti su 20, la commissione stabilisce di valutare le prove con il seguente criterio:

la soglia minima per il raggiungimento dell'idoneità sarà di 14 risposte esatte pari a 14 punti; ad ogni ulteriore risposta corretta verrà attribuito 1 punto fino a raggiungere il massimo di 20, secondo lo schema sottostante:

Risposte esatte	Punteggio su 20
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

I quesiti senza risposta e le risposte errate non comportano detrazione di punteggio, il loro valore quindi è zero;

I tre test, tra cui verrà estratto quello che costituirà l'oggetto d'esame uguale per tutti i candidati, sono i seguenti:

PROVA PRATICA A

(allegata prova pratica A + griglia correzione prova pratica A - le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA PRATICA B

(allegata prova pratica B + griglia correzione prova pratica B- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA PRATICA C

(allegata prova pratica C + griglia correzione prova pratica C- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

La prova estratta dai candidati dott.ssa Mangiavillano Isabella e dott. Cerbone Angelo è la prova pratica - questionario "A". L'elaborato estratto viene fatto firmare da entrambi i candidati che hanno estratto le prove, avendo cura che gli stessi non possano prendere visione delle domande ivi riportate.

Vengono aperte anche le buste "B" e "C" contenenti le prove non estratte (anch'esse sottoscritte dai candidati dott.ssa Mangiavillano Isabella e dott. Cerbone Angelo).

PROVA ORALE

La commissione, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, stabilisce che la prova orale verterà "su argomento scelto dalla Commissione attinente al profilo professionale messo a concorso oltre che sulla verifica degli elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese".

Vengono predisposte dalla commissione, all'unanimità, 12 possibili prove (3 per ciascuna giornata prevista di colloqui ovvero 26 ottobre 2020 ore 8.00, 26 ottobre 2020 ore 13.30, 27 ottobre 2020 ore 8.00 e 28 ottobre 2020 ore 13.30, tutte di medesima difficoltà – ciascuna costituita da due quesiti con l'aggiunta di una domanda per verificare la conoscenza informatica e una domanda per la conoscenza

della lingua inglese – tra cui verrà estratta quella che costituirà l'oggetto dell'esame uguale per tutti i candidati.

PROVE ORALI DEL GIORNO 26/10/2020 ore 8.00

prova orale A

- *"Il candidato illustri le fasi Processo di assistenza infermieristica"*
- *"Il candidato esponga le misure preventive, secondo le raccomandazioni ministeriali, che un infermiere deve attuare per evitare l'errore nella somministrazione della terapia."*
- *"Che cos'è l'hardware?"*
- *"When did you have the last headache?" Which drugs did you take?". Tradurre.*

prova orale B

- *"Il candidato descriva la preparazione e l'assistenza infermieristica al paziente sottoposto a paracentesi"*
- *"Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) e assistere (azioni infermieristiche) un paziente con dispea acuta"*
- *"Che cos'è il backup?"*
- *"How do bed sore lesions form? Who are the people at risk?" Tradurre.*

prova orale C

- *"Il candidato descriva come rilevare la pressione arteriosa incruenta"*
- *"Il candidato esponga le responsabilità dell'infermiere nella gestione del catetere venoso periferico"*
- *"Che cos'è il JPEG?"*
- *"The pap test is a cytological test (removing cells) very useful to diagnose early cancer and pre cancerous lesions of the cervix." Tradurre.*

Prima di procedere con l'effettuazione dei colloqui d'esame, la commissione, all'unanimità, stabilisce che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nella risposta si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni sottese;
- linearità dell'esposizione;
- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della commissione esaminatrice.

La graduazione delle votazioni di sufficienza, dal minimo di 14 al massimo di 20, sarà stabilita tenendo conto del grado di completezza, approfondimento e della chiarezza espositiva.

La prova orale estratta, a cura della candidata dott.ssa Carbonaro Barbara è la prova B.

PROVE ORALI DEL GIORNO 26/10/2020 ore 13.30

prova orale A

- *"Il candidato descriva il ruolo dell'infermiere di famiglia e di comunità"*
- *"Il candidato esponga quali sono le sedi per la rilevazione della temperatura corporea nell'adulto"*
- *"Che cosa significa zippare un file?"*
- *"Which drugs cannot be shredded? What is the correct way to shred drugs?" Tradurre.*

prova orale B

- *"Il candidato descriva la preparazione e l'assistenza infermieristica al paziente sottoposto ad artrocentesi del ginocchio"*
- *"Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) ed intervenire (azioni infermieristiche) in caso di paziente in arresto cardio circolatorio"*
- *Che cos'è Google?"*
- *"Which are the most frequent nursing care needs in surgery?" Tradurre.*

prova orale C

- *"Il candidato descriva come identificare la persona a rischio di lesioni da pressione ed indichi le possibili azioni infermieristiche per prevenire le lesioni da pressione in questa tipologia di pazienti."*
- *"Quali fattori contribuiscono generare gli errori in terapia?"*
- *"Definizione di desktop"*
- *"Respiratory infections often cause epistaxis (nosebleed)"*

Prima di procedere con l'effettuazione dei colloqui d'esame, la commissione, all'unanimità, stabilisce che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nella risposta si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni sottese;
- linearità dell'esposizione;
- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della commissione esaminatrice.

La graduazione delle votazioni di sufficienza, dal minimo di 14 al massimo di 20, sarà stabilita tenendo conto del grado di completezza, approfondimento e della chiarezza espositiva.

La prova orale estratta, a cura del candidato dott. Lo Sciuto Gaspare Massimo è la prova C.

PROVE ORALI DEL GIORNO 27/10/2020 ore 8.00

prova orale A

- *"Il candidato illustri il modello di Primary Nursing"*
- *"Il candidato descriva il ruolo dell'infermiere in fase di dimissione del paziente"*
- *"Che cosa significa logout?"*
- *"Is A.B.G.(Arterial Blood Gas) analysis a test to assess the patient's ventilatory status?"*

prova orale B

- *"Il candidato descriva la preparazione e l'assistenza infermieristica al paziente sottoposto ad intervento di colecistectomia."*
- *"Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) ed assistere (azioni infermieristiche) un paziente in coma ipoglicemico."*
- *"A cosa serve Excel ?"*
- *"Performing a nuclear medicine exam involves administering a radioactive substance."Tradurre.*

prova orale C

- *"Il candidato descriva la gestione del paziente con sospetta malattia infettiva trasmissibile da contatto"*
- *"Il candidato elenchi gli interventi da adottare per prevenire i rischi di complicanze infettive ed occlusive del catetere venoso periferico (c.v.p.)"*
- *"Cosa di intende per SPAM?"*
- *"The appearance of pressure ulcers is not linked to a single cause but there are several factors that contribute to the onset". Tradurre.*

Prima di procedere con l'effettuazione dei colloqui d'esame, la commissione, all'unanimità, stabilisce che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nella risposta si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni sottese;
- linearità dell'esposizione;
- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della commissione esaminatrice.

La graduazione delle votazioni di sufficienza, dal minimo di 14 al massimo di 20, sarà stabilita tenendo conto del grado di completezza, approfondimento e della chiarezza espositiva.

La prova orale estratta, a cura della candidata dott.ssa Pes Federica Pasqua, è la prova A.

PROVE ORALI DEL GIORNO 28/10/2020 ore 13.30

prova orale A

- *"Il candidato descriva il ruolo dell'infermiere Case Manager nella gestione del paziente cronico."*
- *"Il candidato esponga quali sono le misure preventive che l'infermiere deve attuare per evitare l'insorgenza delle lesioni da pressione"*
- *"Che cos'è il software?"*
- *"Before giving the drug to the patient, the nurse must correctly identify him."*

prova orale B

- *"Il candidato descriva la gestione infermieristica del paziente nell'immediato post-operatorio."*
- *"Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) e assistere (azioni infermieristiche) un paziente in edema polmonare"*
- *"In Informatica, che cos'è l'accesso in remoto?"*
- *"Hemorrhage refers to the blood loss of the bloodstream" Tradurre.*

prova orale C

- *"Il candidato descriva come identificare la persona a rischio di caduta e indichi le possibili azioni infermieristiche per prevenire le cadute in questa tipologia di pazienti."*
- *"L'emotrasfusione: sorveglianza e comportamento dell'infermiere in caso di reazioni avverse"*
- *"Quali informazioni di account sono necessarie per accedere ad un'area riservata di un sito Web?"*
- *"The term thrombosis refers to the appearance of a blood clot." Tradurre.*

Prima di procedere con l'effettuazione dei colloqui d'esame, la commissione, all'unanimità, stabilisce che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nella risposta si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni sottese;
- linearità dell'esposizione;
- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della commissione esaminatrice.

La graduazione delle votazioni di sufficienza, dal minimo di 14 al massimo di 20, sarà stabilita tenendo conto del grado di completezza, approfondimento e della chiarezza espositiva.


La prova orale estratta, a cura del candidato dott. Terracina Pasquale è la prova A.

10
el
R

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(dott. Gianfranco Galli)

Handwritten signature of Gianfranco Galli, consisting of stylized initials 'G' and 'G' followed by a horizontal line.

I COMPONENTI:

dott.ssa Francesca Marrone

Handwritten signature of Francesca Marrone, written in cursive and underlined.

dott.ssa Giuliana Pieraccini

Handwritten signature of Giuliana Pieraccini, written in cursive and underlined.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Martina Santambrogio

Handwritten signature of Martina Santambrogio, written in cursive and underlined.



PROVA A

PROVA NON ESTESA, 21/11/2020
Chm Chi *Maurice* *[Signature]*

- 1 **La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) definisce le diagnosi infermieristiche come:**
 - A una diagnosi medica
 - B un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali
 - C un obiettivo infermieristico
 - D una singola definizione concettuale come "obesità", o "malnutrizione"

- 2 **Nella teoria degli obiettivi, la situazione in cui il raggiungimento di un obiettivo specifico deve manifestarsi e, per estensione, gli aiuti o i limiti di tipo materiale e/o psicologico che sono forniti in ordine a ciò alla persona assistita, viene definita come:**
 - A condizione
 - B performance
 - C indicatore
 - D criterio

- 3 **Nel processo di assistenza infermieristica, un obiettivo è:**
 - A un'affermazione sullo stato di salute della persona assistita dopo un intervento infermieristico
 - B un'affermazione sulle azioni che l'infermiere deve compiere per risolvere un problema di salute della persona assistita
 - C un'indicazione di comportamento per le figure di supporto
 - D nessuna delle altre risposte è corretta

- 4 **Tenendo conto dell'incompatibilità dei farmaci, la dopamina non può essere somministrata nella stessa linea di infusione:**
 - A della dobutamina
 - B del ringer lattato
 - C del furosemide
 - D della lidocaina





PROVA A

5 Nella terza fase febbrile:

- A il paziente ha freddo e manifesta vasocostrizione cutanea con possibile brivido in quanto la temperatura corporea diminuisce
- B il paziente ha freddo, manifesta vasocostrizione cutanea e sudorazione calda in quanto la temperatura corporea aumenta
- C il paziente ha caldo, manifesta vasodilatazione cutanea e sudorazione calda in quanto la temperatura diminuisce
- D il paziente ha caldo, manifesta vasodilatazione cutanea con possibile sudorazione anche se la temperatura corporea rimane costante

6 Un ittero lieve, osservato esaminando le sclere alla luce naturale, è di solito evidenziabile quando i valori della bilirubina sierica sono compresi tra:

- A 1,5-2 mg/dl
- B 3,5-4,5 mg/dl
- C 2,5-3 mg/dl
- D 1-1,5mg/dl

7 L'infermiere deve somministrare 600 ml di soluzione glucosata al 20% alla velocità di 40 gtt al minuto; sapendo che 20 gtt corrispondono a 1 ml, quale sarà il tempo totale di infusione?

- A 3 ore
- B 5 ore
- C 6 ore
- D 4 ore

8 Il termine "bradicinesia" indica esattamente:

- A assenza di movimento
- B tremore durante il movimento
- C mancanza di coordinazione
- D nessuna delle altre risposte è corretta





PROVA A

- 9 **In quale complicanza da immobilità può incorrere un paziente con prolungato decubito obbligato a letto?**
- A osteoporosi da disuso
 - B stasi delle secrezioni bronchiali
 - C maggior suscettibilità alle infezioni
 - D tutte le precedenti alternative sono corrette
- 10 **Un paziente fragile ricoverato in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) cade mentre si reca in bagno, la caduta esita in un ematoma a livello trocanterico. Come viene classificato nei programmi di gestione del rischio clinico?**
- A evento avverso
 - B incident reporting
 - C near miss
 - D evento sentinella
- 11 **Si definiscono “infezioni crociate ospedaliere” quelle:**
- A che si verificano in più ospedali della medesima regione contemporaneamente
 - B che si originano e si diffondono all’interno di un singolo ospedale
 - C per le quali si rende necessario il ricovero ospedaliero
 - D che originano prima del ricovero ma che si manifestano in ospedale
- 12 **Secondo le linee guida “precauzioni per l’isolamento” (CDC - 2007) nelle precauzioni aggiuntive per patologie trasmesse per contatto il paziente:**
- A deve essere posto se possibile in stanza singola; se non è possibile creare delle coorti di pazienti
 - B deve essere posto se possibile in stanza singola; non è possibile la creazione delle coorti di pazienti
 - C può essere posto in una stanza con più pazienti ma solo in presenza di tende separatrici
 - D può essere posto in una stanza multipla purché vi sia una distanza di almeno un metro rispetto agli altri pazienti presenti in stanza



PROVA A

- 13 **La variabile che deve necessariamente essere presa in considerazione per valutare l'efficacia di un intervento assistenziale viene definita:**
- A obiettivo
 - B indicatore
 - C standard
 - D audit
- 14 **Con "to care" l'infermieristica indica:**
- A il prendersi cura, inteso come approccio distinto dalle cure mediche
 - B l'assistenza assicurata da figure di supporto o da familiari sotto la supervisione dell'infermiere
 - C l'attività di supporto dell'iter diagnostico e terapeutico gestito dal medico
 - D l'insieme dei trattamenti infermieristici che concorrono alla guarigione delle malattie
- 15 **Secondo la NANDA, la diagnosi infermieristica "deficit della cura del se" può avere come diagnosi correlate tutte le seguenti alternative, tranne una. Quale?**
- A insufficiente volume di liquidi
 - B compromissione della mucosa orale
 - C compromissione della integrità cutanea
 - D ipertermia
- 16 **Tra i seguenti, il dispositivo che permette di somministrare ossigeno alla più elevata concentrazione è:**
- A la cannula nasale, se si opera fino a 6 l al minuto
 - B la maschera di Venturi, se si opera fino a 8 l al minuto
 - C la maschera con serbatoio, se si opera a 10-15 l al minuto
 - D la tenda ad ossigeno




PROVA A

- 17 **Nel ciclo mestruale, partendo dal primo giorno di mestruazione, si distinguono tre fasi. Indicare quale tra le seguenti alternative le riporta nell'ordine corretto:**
- A ovulatoria, follicolare, luteale
 - B luteale, ovulatoria, follicolare
 - C follicolare, ovulatoria, luteale
 - D follicolare, luteale, ovulatoria
- 18 **In quale periodo di gestazione i virus possono attraversare la placenta?**
- A solo nel primo trimestre di gestazione
 - B solo nel secondo trimestre di gestazione
 - C solo nel terzo trimestre di gestazione
 - D in qualsiasi periodo della gestazione
- 19 **Secondo la legge n.42 del 26 febbraio 1999 ("Disposizioni in materia di professioni sanitarie"), il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica è definito dal combinato disposto dei seguenti regolamenti:**
- A profilo professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base
 - B profilo professionale, codice deontologico, contratto nazionale di lavoro
 - C profilo professionale, contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e post-base
 - D contratto nazionale di lavoro, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base
- 20 **Quali obiettivi formativi definisce prioritari il Programma Nazionale ECM ?**
- A obiettivi formativi tecnico-professionali
 - B obiettivi formativi di processo
 - C obiettivi formativi di sistema
 - D tutte le alternative precedenti sono corrette



PROVA A

- 21 Secondo l'art. 23, Capo IV dell'attuale Codice Deontologico, l'Infermiere, tenuto conto dell'età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte:
- A curative, assistenziali ma non sperimentali
 - B curative, assistenziali e sperimentali
 - C solo curative e assistenziali
 - D preventive, assistenziali e sperimentali
- 22 In caso di ricorso alla contenzione, l'infermiere:
- A si adopera affinché esso sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali
 - B ha un ruolo limitato al supporto tecnico dell'operazione
 - C ha il compito di occuparsi del supporto psicologico del paziente e, qualora sia necessario, del supporto farmacologico
 - D non è tenuto a conoscerne le procedure
- 23 Indicare, tra quelle elencate, la definizione etica della relazione tra infermiere e persona assistita:
- A ravvisa nell'integrità e libertà dell'infermiere e dell'ostetrica una garanzia per l'assistito
 - B è una relazione tra soggetti aventi pari dignità e possibilità di valutazione e decisione
 - C è guidata esclusivamente dagli imperativi della non maleficenza e della beneficenza
 - D è una relazione tra soggetti tenuta esclusivamente dall'infermiere e dall'ostetrica esperti
- 24 Nell'assistenza a un paziente con stenosi uretrale correlata a ipertrofia prostatica, è indicato l'utilizzo di un catetere:
- A vescicale Couvelaire
 - B vescicale Foley
 - C vescicale Blakemore
 - D vescicale Nelaton



PROVA A

25 Il riflesso di Moro indica:

- A un tipico "auto-abbraccio" del neonato
- B la capacità di rispondere al dolore
- C la capacità di rispondere a stimoli visivi
- D la capacità di rispondere a stimoli sonori

26 Secondo le più recenti linee guida del BLS, le mani per le compressioni toraciche in caso di massaggio cardiaco vanno posizionate:


- A sul centro del torace, appoggiate sullo sterno
- B sul terzo inferiore del torace, appoggiate sullo sterno
- C sul terzo superiore del torace, appoggiate sullo sterno
- D sullo sterno, a due dita dal processo xifoideo

27 Come è chiamata la raccolta dei dati effettuata nel momento in cui il paziente entra nella struttura sanitaria o viene preso in carico?

- A accertamento mirato
- B accertamento iniziale
- C accertamento personalizzato
- D diagnosi infermieristica

28 Secondo la concezione di Florence Nightingale, lo scopo dell'assistenza infermieristica è «mettere l'individuo nelle migliori condizioni affinché ...possa agire e apportare la guarigione». Il termine da inserire al posto dei puntini:

- A il medico
- B un farmaco
- C la natura
- D il trattamento





PROVA A

- 29 **Un comportamento doloso si caratterizza per:**
- A volontarietà della condotta e previsione dell'evento dannoso che ne consegue
 - B volontarietà della condotta ma non previsione dell'evento dannoso che ne consegue
 - C non volontarietà della condotta e previsione dell'evento dannoso che ne consegue
 - D volontarietà della condotta senza comparsa di evento dannoso conseguente
- 30 **Qual è il comportamento corretto in seguito ad esposizione accidentale al virus dell'epatite virale B, in un soggetto precedentemente non vaccinato?**
- A somministrare solo una dose di immunoglobuline specifiche
 - B iniziare la vaccinazione
 - C somministrare sia una dose di vaccino sia una dose di immunoglobuline specifiche
 - D somministrare una dose di antibiotico



PROVA ESTRATTA, 21/10/2020

PROVA B


Chiara Lyly
Monorel

- 1 «Proposta di codifica del linguaggio infermieristico, in genere elaborata da un'istituzione professionale di livello internazionale, avente lo scopo di standardizzare in un formato universalmente accettabile i sistemi informativi e di documentazione dell'assistenza infermieristica».
Si tratta della definizione di:
 - A Evidence-Based Nursing
 - B processo di assistenza infermieristica
 - C sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica
 - D teoria dell'assistenza infermieristica

- 2 **Quale visione del paziente è supportata dal modello olistico?**
 - A il paziente è considerato come una persona che ha una elaborazione anche cognitiva del suo vissuto emotivo e della sua malattia
 - B il paziente è considerato come una somma di parti che devono essere analizzate singolarmente da vari specialisti al fine di giungere ad una conoscenza approfondita della sua situazione
 - C il paziente è considerato nella sua totalità, poiché la sua salute è il risultato della continua relazione e comunicazione tra tutti i sistemi di cui è composto
 - D il paziente viene considerato attraverso i metodi provenienti dalle cosiddette medicine alternative che comprendono anche il ricorso alla psicologia

- 3 **Nel processo di assistenza infermieristica la valutazione NON è:**
 - A l'ultima fase del processo
 - B la fase in cui vengono decisi gli interventi
 - C la fase che precede una nuova raccolta dei dati
 - D il momento della verifica degli obiettivi prefissati

- 4 **Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi?**
 - A acido acetilsalicilico, ketoprofene, naprossene
 - B acido acetilsalicilico, meperidina, ketoprofene
 - C ibuprofene, naprossene, oxicodone
 - D ibuprofene, oxicodone, acido acetilsalicilico




PROVA B

- 5 **Si può definire ricorrente una febbre come:**
- A aumento della temperatura nelle 24 ore, con dei picchi che si presentano in genere nel tardo pomeriggio
 - B aumento della temperatura, che si mantiene elevata ma con fluttuazioni notevoli nelle 24 ore
 - C temperatura elevata per molti giorni, alternati a molti giorni di temperatura normale
 - D temperatura elevata per molti giorni, alternati ad un solo giorno di temperatura normale
- 6 **Quali anomalie elettrolitiche sono frequentemente rinvenute nel morbo di Addison?**
- A ipocalcemia
 - B ipopotassiemia
 - C ipernatriemia e ipopotassiemia
 - D iponatriemia e iperpotassiemia
- 7 **Per accertare la presenza di dispnea quale segno o sintomo è necessario?**
- A saO2 ridotta
 - B difficoltà di respiro percepita
 - C frequenza respiratoria elevata
 - D cianosi periferica
- 8 **L'atassia rappresenta un segno clinico che indica:**
- A uno stato depressivo del paziente
 - B un disturbo della coordinazione motoria
 - C l'incapacità a deglutire cibi liquidi e solidi
 - D l'incapacità di comunicare verbalmente




PROVA B

- 9 **Nell'ambito del trattamento delle lesioni da pressione, in presenza di un'escara stabile e senza eritema perilesionale localizzata sui talloni è indicato:**
- A effettuare lo sbrigliamento di tipo chirurgico
 - B effettuare lo sbrigliamento autolitico
 - C effettuare lo sbrigliamento enzimatico
 - D favorire la mummificazione per disidratazione dell'escara
- 10 **Qual è la definizione di “near miss” nell’ambito del sistema qualità?**
- A errore che causa un evento sentinella e che richiede una segnalazione immediata e dedicata
 - B errore che causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito o perché ha conseguenze avverse per il paziente
 - C errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
 - D errore che non causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
- 11 **Per “asepsi” si intende:**
- A un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
 - B un insieme di norme atte a impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni
 - C un processo che permette l’eliminazione di ogni microrganismo vivente (batteri, spore, miceti e virus)
 - D la detersione eseguita mediante l’uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente
- 12 **L’infermiere deve somministrare 500 ml di soluzione glucosata al 5% in due ore. A che velocità imposterà la pompa infusoriale o il regolatore di flusso?**
- A 250 ml/h
 - B 200 ml/h
 - C 500ml/h
 - D 75 ml/h



PROVA B

- 13 **Gli indicatori di struttura si riferiscono:**
- A ai fattori produttivi impiegati nel processo di assistenza, cioè alla dimensione quantitativa e qualitativa delle risorse di materiale e di personale assegnate
 - B alle modalità da rispettare nella conduzione di interventi assistenziali
 - C alle modalità con le quali vengono prese le decisioni assistenziali
 - D ai risultati misurabili e osservabili dell'assistenza infermieristica assicurata a una persona assistita
- 14 **La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Core) è:**
- A una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti anziani fragili
 - B una scala di valutazione del rischio di lesioni da decubito negli adulti
 - C una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata
 - D uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica
- 15 **Quale dei seguenti segni o sintomi presentano i pazienti per i quali è stata enunciata la diagnosi infermieristica "insufficiente volume di liquidi extracellulari"?**
- A ipotensione
 - B accresciuto output urinario
 - C diluizione delle urine
 - D congestione polmonare
- 16 **Il catetere di Dufour è un catetere:**
- A vescicale rigido a una via indicato nelle cateterizzazioni con ipertrofie prostatiche gravi
 - B vescicale semirigido autostatico a tre vie indicato per il lavaggio vescicale
 - C venoso centrale per la rilevazione continua della pressione venosa centrale
 - D venoso centrale per la somministrazione di soluzione parenterale a lungo termine



PROVA B

17 **Viene definito puerperio il periodo:**

- A compreso tra la fine dell'espulsione del feto e la ripresa dell'attività ovarica
- B compreso tra la fine del parto e la ripresa dell'attività ciclica ovarica
- C che comprende le prime due settimane dopo il parto
- D che comprende i primi tre mesi dopo il parto

18 **La corretta tenuta della documentazione infermieristica è normata da:**

- A art. 263 del C.P., art. 574 del C.P., L. 462/99
- B art. 326 del C.P., art. 574 del C.P., L. 462/99
- C art. 263 del C.P., art. 574 del C.P., L. 675/96
- D art. 326 del C.P., art. 622 del C.P., L. 675/96

19 **Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, le compressioni toraciche devono:**

- A avere frequenza di 120 compressioni al minuto
- B abbassare il torace di 3 – 4 cm
- C avere frequenza di 80 compressioni al minuto
- D abbassare il torace di 5 – 6 cm

20 **Nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM), è da ritenersi esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti per tutto il periodo di formazione, il personale sanitario che:**

- A frequenta corsi annuali di formazione post laurea propri del profilo di appartenenza
- B presta servizio in strutture private
- C non ha ancora completato il periodo di prova
- D opera come libero professionista



**PROVA B**

- 21 **Secondo l'art. 24, Capo IV dell'attuale Codice Deontologico, l'Infermiere che presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita:**
- A riconosce l'importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure e della palliazione
 - B riconosce l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale
 - C sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto
 - D tutte le alternative precedenti
- 22 **Il trasporto del paziente è in ossigeno a 15/l min e ho una bombola di 5l a 150 atm, il viaggio quanto può durare:**
- A 5 ore
 - B 10 minuti
 - C 2 ore
 - D 50 minuti
- 23 **Qual è l'azione più corretta qualora si rompesse accidentalmente una fiala contenente un farmaco ad azione stupefacente?**
- A si scarica il farmaco registrandolo a nome del paziente che ne fa uso
 - B si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell'apposito registro
 - C non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato
 - D si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico del materiale consumato sull'apposito registro
- 24 **Quali sono i parametri che permettono di distinguere e differenziare i cateteri?**
- A calibro, materiale, consistenza, estremità distale
 - B calibro, materiale, consistenza, numero delle vie ed estremità prossimale
 - C calibro, materiale, consistenza, numero delle vie ed estremità distale
 - D calibro, materiale, diametro, numero delle vie ed estremità prossimale



PROVA B

- 25 **Quale dei seguenti NON è un parametro utilizzato nel punteggio di Apgar?**
- A frequenza cardiaca
 - B temperatura corporea
 - C attività respiratoria
 - D colorito cutaneo
- 26 **Qual è il tempo minimo necessario per un prodotto a base alcolica per eliminare la maggior parte dei germi sulle tue mani?**
- A 3 secondi
 - B 20 secondi
 - C 1 minuto
 - D 45 secondi
- 27 **Per “validazione dei dati” si intende:**
- A la raccolta dei soli dati di stretta pertinenza infermieristica
 - B il controllo dell’accuratezza delle informazioni ottenute
 - C l’organizzazione dei dati raccolti secondo un determinato modello teorico dell’assistenza
 - D la trasformazione di un’ipotesi diagnostica in una diagnosi infermieristica
- 28 **L’infermiera che ha elaborato la teoria dell’assistenza infermieristica come «soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona» è:**
- A Florence Nightingale
 - B Hildegard Peplau
 - C Virginia Henderson
 - D Martha Rogers



PROVA B

29 Qual è il significato della parola "concussione"?

- A reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, ottiene denaro o vantaggi per sé o per altri.
- B condizione di coloro che vivono in stato coniugale senza essere sposati.
- C l'insieme delle trattative intese a concludere un accordo.
- D Nessuna delle alternative precedenti è corretta.

30 Quale tra le seguenti misure può essere considerata come profilassi indiretta delle malattie trasmissibili?

- A isolamento e contumacia
- B miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ambientali
- C immunoprofilassi attiva
- D notifica di malattia infettiva





PROVA NON ESTRATTA, 21/10/20

PROVA C

Chiazzelli Mallouf

- 1 **Gli elementi descritti dall' International Classification for Nursing Practice sono:**
 - A i fenomeni di nursing
 - B le diagnosi infermieristiche
 - C gli interventi e i risultati dell'assistenza infermieristica
 - D i fenomeni di nursing, le azioni e i risultati dell'assistenza infermieristica

- 2 **La finalità del Nursing è, per V. Henderson, quella di assistere la persona a:**
 - A riacquistare la propria indipendenza, il più rapidamente possibile
 - B la capacità di curarsi da solo
 - C l'autosomministrazione dei farmaci prescritti dal medico
 - D l'equilibrio e l'armonia con l'ambiente


- 3 **Con la locuzione "personalizzazione dell'assistenza infermieristica" in genere si intende la capacità di:**
 - A pianificare l'assistenza attraverso una corretta formulazione degli obiettivi
 - B formulare una corretta diagnosi infermieristica
 - C adattare l'intervento professionale ai costituenti soggettivi che la persona esprime come portatrice di bisogni
 - D assicurare un approccio accogliente e più umano durante l'ospedalizzazione

- 4 **Qual è il meccanismo di azione dei farmaci anticoagulanti orali (TAO)?**
 - A inibiscono l'azione della vitamina K
 - B esplicano attività trombo-embolica
 - C agiscono legandosi all'antitrombina III
 - D tutte le altre alternative proposte sono corrette



PROVA C

- 5 **Se la temperatura corporea si abbassa e si innalza significativamente 2 o più volte al giorno di oltre 1°, senza però mai tornare a valori normali, si parla di febbre ...**
- A continua
 - B ricorrente
 - C remittente
 - D intermittente
- 6 **I livelli sierici del peptide natriuretico atriale nel paziente con scompenso cardiaco cronico sono correlati con:**
- A età del paziente
 - B sesso ed età del paziente
 - C grado di danno funzionale
 - D valori di pressione sistolica
- 7 **Quali sono le variazioni emodinamiche presenti nello shock ipovolemico?**
- A ipotensione, bradicardia, resistenze periferiche normali o ridotte, bassa pressione venosa centrale
 - B ipotensione, tachicardia, resistenze periferiche aumentate, bassa pressione venosa centrale
 - C pressione arteriosa normale o aumentata, frequenza cardiaca normale o diminuita, resistenze periferiche ridotte, alta pressione venosa centrale
 - D ipotensione, tachicardia, resistenze periferiche diminuite, bassa pressione venosa centrale
- 8 **Per "emianopsia" si intende:**
- A la perdita totale della vista da un solo occhio
 - B la perdita di metà campo visivo
 - C la paralisi omolaterale dei muscoli oculari
 - D una forma di diplopia che colpisce un solo occhio



PROVA C

- 9 **Quali dei seguenti raggruppamenti include maggiormente fattori di rischio delle lesioni da pressione?**
- A obesità, attrito, età < 60, umidità, ipotermia
 - B malnutrizione, attrito, età avanzata, albuminemia normale, ipertensione
 - C età avanzata, umidità, obesità, ipotermia, cute idratata
 - D pressione, attrito, frizione, malnutrizione, età avanzata, umidità
- 10 **L'evento avverso è:**
- A un danno causato a un utente dalla gestione clinica e dipendente dalle sue condizioni, il quale causa la morte, una malattia che prolunga la degenza, una disabilità, o anche solo una sofferenza transitoria
 - B un danno causato a un utente dalla gestione clinica e non dipendente dalle sue condizioni, il quale causa una malattia che prolunga la degenza, una disabilità o una sofferenza transitoria ma non la morte
 - C un danno causato a un utente dalla gestione clinica e non dipendente dalle sue condizioni, il quale causa la morte, una malattia che prolunga la degenza, una disabilità, o anche solo una sofferenza transitoria
 - D un danno causato a un utente dalla gestione clinica e dipendente dalle sue condizioni, il quale potrebbe causare la morte, una malattia che prolunga la degenza, una disabilità o una sofferenza transitoria
- 11 **La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali / superfici precedentemente detersi è il processo di:**
- A decontaminazione
 - B disinfezione
 - C detersione
 - D sterilizzazione





PROVA C

- 12 **Indicare, tra le seguenti, la misura raccomandata per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie, secondo il Centers for Disease Control di Atlanta (CDC).**
- A nell'assistenza infermieristica alle persone cateterizzate, il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato, che si usino i guanti o meno, prima e dopo qualsiasi manipolazione del sistema di drenaggio
 - B lavarsi le mani e indossare guanti puliti prima di manipolare il rubinetto di scarico dell'urina e assicurarsi che questo non venga mai a contatto con il pavimento
 - C la cateterizzazione uretrale e tutte le manovre assistenziali sul catetere devono essere eseguite solo da personale qualificato
 - D tutte le altre alternative sono corrette
- 13 **Lo standard di qualità è:**
- A il valore atteso , prestabilito, per un indicatore, secondo criteri di qualità
 - B il valore numerico massimo raggiungibile
 - C una variabile che non può essere descritta con un valore numerico
 - D una variabile che consenta di descrivere fenomeni complessi e di prendere decisioni per ottenere o mantenere cambiamenti
- 14 **Quale fra le seguenti scale per la valutazione del dolore è indicata nell'anziano con deficit cognitivo?**
- A PAINAD
 - B CPOT
 - C BPS
 - D nessuna delle alternative proposte
- 15 **La diagnosi infermieristica "liberazione inefficace delle vie aeree" identifica:**
- A lo stato di un individuo la cui inspirazione e/o espirazione non è adeguata
 - B lo stato di un individuo con deficit di ossigenazione
 - C nessuna delle altre risposte è corretta
 - D lo stato di un individuo con compromissione della ventilazione spontanea



PROVA C

16 Il sondino di aspirazione di Salem:

- A ha un solo volume, fori terminali e laterali, ed è indicato per la nutrizione enterale
- B è bilume, permette la decompressione gastrica e l'ingresso di aria per evitare l'effetto vacuum sulla mucosa gastrica
- C è bilume, indicato per la somministrazione di nutrizione enterale e medicinali contemporaneamente
- D è indicato per l'aspirazione passiva delle secrezioni gastro-duodenali

17 Secondo il "Profilo professionale dell'infermiere" le aree previste per la formazione post- base e la pratica specialistica sono:

- A sanità pubblica, medicina, chirurgia, pronto soccorso, area critica
- B sanità pubblica, ostetricia, pediatria, ortopedia-traumatologia, area critica
- C sanità pubblica, pediatria, psichiatria, geriatria, area critica
- D sanità pubblica, pediatria, medicina-chirurgia, geriatria, area critica

18 Entro quanto tempo dal parto deve essere eseguita l'immunoprofilassi Rh?

- A 24 ore
- B 36 ore
- C 76 ore
- D una settimana

19 L'art.1 della legge n.251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica svolgono assistenza:

- A con autonomia professionale e utilizzano metodologia di pianificazione per obiettivi
- B con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- C con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinari
- D con autonomia professionale limitata dall'ambito specifico di specializzazione



PROVA C

20 Quale di queste affermazioni, relative alla formazione post-base, è vera?

- A al corso di laurea magistrale possono accedere, previa prova di accesso selettiva, tutti gli infermieri
- B al corso di laurea magistrale possono accedere, previa prova di accesso selettiva, solo gli infermieri con laurea triennale
- C al corso di laurea magistrale possono accedere, oltre agli infermieri laureati, anche gli infermieri con diploma conseguito nelle scuole regionali, purché in possesso di maturità quinquennale, previa prova di accesso selettiva
- D ai master universitari di primo livello possono accedere solo gli infermieri con laurea triennale

21 In base all'art.18, Capo IV dell'attuale Codice Deontologico, l'infermiere:

- A rileva, interviene e documenta il dolore dell'assistito durante il ricovero
- B previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura
- C rileva e documenta il dolore dell'assistito
- D previene, rileva e interviene sul dolore dell'assistito

22 Indica quale dei seguenti comportamenti è opportuno seguire per evitare errori nella fase di somministrazione, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute:

- A richiedere nei capitolati d'acquisto l'assenza di situazioni di rischio (lo stesso colore delle confezioni per dosaggi diversi della stessa forma farmaceutica o il nome simile)
- B evitare prescrizioni incomplete o che generano confusione relativamente alla via di somministrazione e alla forma farmaceutica
- C leggere attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la concentrazione, la via di somministrazione, la scadenza, l'etichetta del farmaco, eventualmente la velocità della pompa di infusione e controllare le linee di raccordo
- D disporre di una procedura per la conservazione dei farmaci ad "alto rischio"



PROVA C

23 Rientrano nella definizione di etica:

- A i diritti e i doveri, le regole e i componenti che devono essere rispettati dagli operatori sanitari e sociali
- B gli elementi che permettono di discernere i comportamenti umani buoni, giusti e leciti da quelli cattivi, ingiusti e illeciti
- C gli interventi umani sull'uomo, resi leciti dalla ricerca medica e biomedica
- D nessuna delle altre risposte è corretta

24 Nel cateterismo vescicale, sono definiti "sistemi a circuito chiuso":

- A i contenitori di raccolta
- B i cateteri vescicali rigidi o semirigidi
- C le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi
- D nessuna delle altre risposte è corretta

25 Nella testa fetale la piccola fontanella è una formazione cartilagineo-membranosa in cui confluiscono:

- A la sutura coronaria bilaterale e la sutura metopica bilaterale
- B i due segmenti laterali della sutura lambdoidea e la sutura sagittale
- C la sutura coronaria bilaterale, la sutura metopica, la sutura sagittale
- D la sutura temporale, la sutura metopica, la sutura sagittale

26 Quale tra le seguenti affermazioni sulla nutrizione enterale attraverso la Peg (gastrostomia endoscopica percutanea) è falsa?

- A il set d'infusione deve essere sostituito ogni 24 h
- B è fortemente sconsigliato aggiungere farmaci alla sacca in cui è contenuta la miscela nutritiva
- C durante la Net è necessario far assumere al paziente la posizione Fowler o semiFowler
- D è necessario effettuare il controllo del ristagno gastrico ogni 12 h solo nella fase di avvio della Net



PROVA C

27 Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono:

- A formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione
- B raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, valutazione, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione degli interventi
- C raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione
- D raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione

28 Il modello teorico del Nursing proposto da Marisa Cantarelli è definito:

- A modello delle competenze infermieristiche
- B modello delle prestazioni infermieristiche
- C modello delle mansioni infermieristiche
- D modello del Nursing basato sulle prove di efficacia

29 Tra le seguenti opzioni indicare la definizione del concetto di "imperizia".

- A avere una condotta superficiale e disattenta
- B non trascrivere i propri atti sulla documentazione clinica
- C non saper mettere in pratica ciò che si dovrebbe aver acquisito secondo il proprio corso di studi e la propria esperienza
- D mettere in atto presidi medico-chirurgici che vanno oltre le proprie capacità tecniche e culturali

30 Quali delle seguenti affermazioni sui vaccini è corretta?

- A non si possono somministrare nella stessa seduta vaccini diversi tranne quelli combinati in una unica preparazione
- B per i vaccini costituiti da anatossine è sufficiente un'unica inoculazione
- C per la preparazione del vaccino anti epatite B è utilizzata la tecnica del DNA ricombinante
- D i vaccini uccisi hanno una efficacia protettiva maggiore di quelli vivi purché venga rispettata l'integrità genica dei virus o batteri in essi contenuti



PROVA A

- 1 **La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) definisce le diagnosi infermieristiche come:**
- A una diagnosi medica
 - B un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali
 - C un obiettivo infermieristico
 - D una singola definizione concettuale come "obesità", o "malnutrizione"
- 2 **Nella teoria degli obiettivi, la situazione in cui il raggiungimento di un obiettivo specifico deve manifestarsi e, per estensione, gli aiuti o i limiti di tipo materiale e/o psicologico che sono forniti in ordine a ciò alla persona assistita, viene definita come:**
- A condizione
 - B performance
 - C indicatore
 - D criterio
- 3 **Nel processo di assistenza infermieristica, un obiettivo è:**
- A un'affermazione sullo stato di salute della persona assistita dopo un intervento infermieristico
 - B un'affermazione sulle azioni che l'infermiere deve compiere per risolvere un problema di salute della persona assistita
 - C un'indicazione di comportamento per le figure di supporto
 - D nessuna delle altre risposte è corretta
- 4 **Tenendo conto dell'incompatibilità dei farmaci, la dopamina non può essere somministrata nella stessa linea di infusione:**
- A della dobutamina
 - B del ringer lattato
 - C del furosemide
 - D della lidocaina

PROVA A

5 **Nella terza fase febbrile:**

- A il paziente ha freddo e manifesta vasocostrizione cutanea con possibile brivido in quanto la temperatura corporea diminuisce
- B il paziente ha freddo, manifesta vasocostrizione cutanea e sudorazione calda in quanto la temperatura corporea aumenta
- C il paziente ha caldo, manifesta vasodilatazione cutanea e sudorazione calda in quanto la temperatura diminuisce
- D il paziente ha caldo, manifesta vasodilatazione cutanea con possibile sudorazione anche se la temperatura corporea rimane costante

6 **Un ittero lieve, osservato esaminando le sclere alla luce naturale, è di solito evidenziabile quando i valori della bilirubina sierica sono compresi tra:**

- A 1,5-2 mg/dl
- B 3,5-4,5 mg/dl
- C 2,5-3 mg/dl
- D 1-1,5mg/dl

7 **L'infermiere deve somministrare 600 ml di soluzione glucosata al 20% alla velocità di 40 gtt al minuto; sapendo che 20 gtt corrispondono a 1 ml, quale sarà il tempo totale di infusione?**

- A 3 ore
- B 5 ore
- C 6 ore
- D 4 ore

8 **Il termine "bradicinesia" indica esattamente:**

- A assenza di movimento
- B tremore durante il movimento
- C mancanza di coordinazione
- D nessuna delle altre risposte è corretta

PROVA A

- 9 **In quale complicanza da immobilità può incorrere un paziente con prolungato decubito obbligato a letto?**
- A osteoporosi da disuso
 - B stasi delle secrezioni bronchiali
 - C maggior suscettibilità alle infezioni
 - D tutte le precedenti alternative sono corrette**
- 10 **Un paziente fragile ricoverato in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) cade mentre si reca in bagno, la caduta esita in un ematoma a livello trocanterico. Come viene classificato nei programmi di gestione del rischio clinico?**
- A evento avverso**
 - B incident reporting
 - C near miss
 - D evento sentinella
- 11 **Si definiscono "infezioni crociate ospedaliere" quelle:**
- A che si verificano in più ospedali della medesima regione contemporaneamente
 - B che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale**
 - C per le quali si rende necessario il ricovero ospedaliero
 - D che originano prima del ricovero ma che si manifestano in ospedale
- 12 **Secondo le linee guida "precauzioni per l'isolamento" (CDC, 2007) nelle precauzioni aggiuntive per patologie trasmesse per contatto il paziente:**
- A deve essere posto se possibile in stanza singola; se non è possibile creare delle coorti di pazienti**
 - B deve essere posto se possibile in stanza singola; non è possibile la creazione delle coorti di pazienti
 - C può essere posto in una stanza con più pazienti ma solo in presenza di tende separatrici
 - D può essere posto in una stanza multipla purché vi sia una distanza di almeno un metro rispetto agli altri pazienti presenti in stanza

PROVA A

- 13 **La variabile che deve necessariamente essere presa in considerazione per valutare l'efficacia di un intervento assistenziale viene definita:**
- A obiettivo
 - B indicatore
 - C standard
 - D audit
- 14 **Con "to care" l'infermieristica indica:**
- A il prendersi cura, inteso come approccio distinto dalle cure mediche
 - B l'assistenza assicurata da figure di supporto o da familiari sotto la supervisione dell'infermiere
 - C l'attività di supporto dell'iter diagnostico e terapeutico gestito dal medico
 - D l'insieme dei trattamenti infermieristici che concorrono alla guarigione delle malattie
- 15 **Secondo la NANDA, la diagnosi infermieristica "deficit della cura del se" può avere come diagnosi correlate tutte le seguenti alternative, tranne una. Quale?**
- A insufficiente volume di liquidi
 - B compromissione della mucosa orale
 - C compromissione della integrità cutanea
 - D ipertermia
- 16 **Tra i seguenti, il dispositivo che permette di somministrare ossigeno alla più elevata concentrazione è:**
- A la cannula nasale, se si opera fino a 6 l al minuto
 - B la maschera di Venturi, se si opera fino a 8 l al minuto
 - C la maschera con serbatoio, se si opera a 10-15 l al minuto
 - D la tenda ad ossigeno
- 17 **Nel ciclo mestruale, partendo dal primo giorno di mestruazione, si distinguono tre fasi. Indicare quale tra le seguenti alternative le riporta nell'ordine corretto:**
- A ovulatoria, follicolare, luteale
 - B luteale, ovulatoria, follicolare
 - C follicolare, ovulatoria, luteale
 - D follicolare, luteale, ovulatoria

PROVA A

- 18 **In quale periodo di gestazione i virus possono attraversare la placenta?**
- A solo nel primo trimestre di gestazione
 - B solo nel secondo trimestre di gestazione
 - C solo nel terzo trimestre di gestazione
 - D** in qualsiasi periodo della gestazione
- 19 **Secondo la legge n.42 del 26 febbraio 1999 (“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”), il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica è definito dal combinato disposto dei seguenti regolamenti:**
- A** profilo professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base
 - B profilo professionale, codice deontologico, contratto nazionale di lavoro
 - C profilo professionale, contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e post-base
 - D contratto nazionale di lavoro, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base
- 20 **Quali obiettivi formativi definisce prioritari il Programma Nazionale ECM ?**
- A obiettivi formativi tecnico-professionali
 - B obiettivi formativi di processo
 - C obiettivi formativi di sistema
 - D** tutte le alternative precedenti sono corrette
- 21 **Secondo l'art. 23, Capo IV dell'attuale Codice Deontologico, l'Infermiere, tenuto conto dell'età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte:**
- A curative, assistenziali ma non sperimentali
 - B** curative, assistenziali e sperimentali
 - C solo curative e assistenziali
 - D preventive, assistenziali e sperimentali

22 **In caso di ricorso alla contenzione, l'infermiere:**

- A si adopera affinché esso sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali
- B ha un ruolo limitato al supporto tecnico dell'operazione
- C ha il compito di occuparsi del supporto psicologico del paziente e, qualora sia necessario, del supporto farmacologico
- D non è tenuto a conoscerne le procedure

23 **Indicare, tra quelle elencate, la definizione etica della relazione tra infermiere e persona assistita:**

- A ravvisa nell'integrità e libertà dell'infermiere e dell'ostetrica una garanzia per l'assistito
- B è una relazione tra soggetti aventi pari dignità e possibilità di valutazione e decisione
- C è guidata esclusivamente dagli imperativi della non maleficenza e della beneficenza
- D è una relazione tra soggetti tenuta esclusivamente dall'infermiere e dall'ostetrica esperti

24 **Nell'assistenza a un paziente con stenosi uretrale correlata a ipertrofia prostatica, è indicato l'utilizzo di un catetere:**

- A vescicale Couvelaire
- B vescicale Foley
- C vescicale Blakemore
- D vescicale Nelaton

25 **Il riflesso di Moro indica:**

- A un tipico "auto-abbraccio" del neonato
- B la capacità di rispondere al dolore
- C la capacità di rispondere a stimoli visivi
- D la capacità di rispondere a stimoli sonori

26 **Secondo le più recenti linee guida del BLS, le mani per le compressioni toraciche in caso di massaggio cardiaco vanno posizionate:**

- A sul centro del torace, appoggiate sullo sterno
- B sul terzo inferiore del torace, appoggiate sullo sterno
- C sul terzo superiore del torace, appoggiate sullo sterno
- D sullo sterno, a due dita dal processo xifoideo

PROVA A

- 27 **Come è chiamata la raccolta dei dati effettuata nel momento in cui il paziente entra nella struttura sanitaria o viene preso in carico?**
- A accertamento mirato
 - B accertamento iniziale
 - C accertamento personalizzato
 - D diagnosi infermieristica
- 28 **Secondo la concezione di Florence Nightingale, lo scopo dell'assistenza infermieristica è <<mettere l'individuo nelle migliori condizioni affinché ... possa agire e apportare la guarigione>>. Il termine da inserire al posto dei puntini:**
- A il medico
 - B un farmaco
 - C la natura
 - D il trattamento
- 29 **Un comportamento doloso si caratterizza per:**
- A volontarietà della condotta e previsione dell'evento dannoso che ne consegue
 - B volontarietà della condotta ma non previsione dell'evento dannoso che ne consegue
 - C non volontarietà della condotta e previsione dell'evento dannoso che ne consegue
 - D volontarietà della condotta senza comparsa di evento dannoso conseguente
- 30 **Qual è il comportamento corretto in seguito ad esposizione accidentale al virus dell'epatite virale B, in un soggetto precedentemente non vaccinato?**
- A somministrare solo una dose di immunoglobuline specifiche
 - B iniziare la vaccinazione
 - C somministrare sia una dose di vaccino sia una dose di immunoglobuline specifiche
 - D somministrare una dose di antibiotico

PROVA B

- 1 <<Proposta di codifica del linguaggio infermieristico, in genere elaborata da un'istituzione professionale di livello internazionale, avente lo scopo di standardizzare in un formato universalmente accettabile, i sistemi informativi e di documentazione dell'assistenza infermieristica>>.
Si tratta della definizione di:
- A evidence-based Nursing
 - B processo di assistenza infermieristica
 - C sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica**
 - D teoria dell'assistenza infermieristica
- 2 **Quale visione del paziente è supportata dal modello olistico?**
- A il paziente è considerato come una persona che ha una elaborazione anche cognitiva del suo vissuto emotivo e della sua malattia
 - B il paziente è considerato come una somma di parti che devono essere analizzate singolarmente da vari specialisti al fine di giungere ad una conoscenza approfondita della sua situazione
 - C il paziente è considerato nella sua totalità, poiché la sua salute è il risultato della continua relazione e comunicazione tra tutti i sistemi di cui è composto**
 - D il paziente viene considerato attraverso i metodi provenienti dalle cosiddette medicine alternative che comprendono anche il ricorso alla psicologia
- 3 **Nel processo di assistenza infermieristica la valutazione NON è:**
- A l'ultima fase del processo
 - B la fase in cui vengono decisi gli interventi**
 - C la fase che precede una nuova raccolta dei dati
 - D il momento della verifica degli obiettivi prefissati
- 4 **Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi?**
- A acido acetilsalicilico, ketoprofene, naprossene**
 - B acido acetilsalicilico, meperidina, ketoprofene
 - C ibuprofene, naprossene, oxicodone
 - D ibuprofene, oxicodone, acido acetilsalicilico
- 5 **Si può definire ricorrente una febbre come:**
- A aumento della temperatura nelle 24 ore, con dei picchi che si presentano in genere nel tardo pomeriggio**
 - B aumento della temperatura, che si mantiene elevata ma con fluttuazioni notevoli nelle 24 ore
 - C temperatura elevata per molti giorni, alternati a molti giorni di temperatura normale
 - D temperatura elevata per molti giorni, alternati ad un solo giorno di temperatura normale
- 6 **Quali anomalie elettrolitiche sono frequentemente rinvenute nel morbo di Addison?**
- A ipocalcemia**
 - B ipopotassiemia**
 - C ipernatriemia e ipopotassiemia**
 - D iponatriemia e iperpotassiemia**

PROVA B

- 7 **Per accertare la presenza di dispnea quale segno o sintomo è necessario?**
- A saO₂ ridotta
 - B** difficoltà di respiro percepita
 - C frequenza respiratoria elevata
 - D cianosi periferica
- 8 **L'atassia rappresenta un segno clinico che indica:**
- A uno stato depressivo del paziente
 - B** un disturbo della coordinazione motoria
 - C l'incapacità a deglutire cibi liquidi e solidi
 - D l'incapacità di comunicare verbalmente
- 9 **Nell'ambito del trattamento delle lesioni da pressione, in presenza di un'escara stabile e senza eritema perilesionale localizzata sui talloni è indicato:**
- A effettuare lo sbrigliamento di tipo chirurgico
 - B effettuare lo sbrigliamento autolitico
 - C effettuare lo sbrigliamento enzimatico
 - D** favorire la mummificazione per disidratazione dell'escara
- 10 **Qual è la definizione di "near miss" nell'ambito del sistema qualità?**
- A errore che causa un evento sentinella e che richiede una segnalazione immediata e dedicata
 - B errore che causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito o perché ha conseguenze avverse per il paziente
 - C** errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
 - D errore che non causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
- 11 **Per "asepsi" si intende:**
- A un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
 - B** un insieme di norme atte a impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni
 - C un processo che permette l'eliminazione di ogni microrganismo vivente (batteri, spore, miceti e virus)
 - D la detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente
- 12 **L'infermiere deve somministrare 500 ml di soluzione glucosata al 5% in due ore. A che velocità imposterà la pompa infusoriale o il regolatore di flusso?**
- A** 250 ml/h
 - B 200 ml/h
 - C 500 ml/h
 - D 75 ml/h

13 **Gli indicatori di struttura si riferiscono:**

- A ai fattori produttivi impiegati nel processo di assistenza, cioè alla dimensione quantitativa e qualitativa delle risorse di materiale e di personale assegnate
- B alle modalità da rispettare nella conduzione di interventi assistenziali
- C alle modalità con le quali vengono prese le decisioni assistenziali
- D ai risultati misurabili e osservabili dell'assistenza infermieristica assicurata a una persona assistita

14 **La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Core) è:**

- A una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti anziani fragili
- B una scala di valutazione del rischio di lesioni da decubito negli adulti
- C una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata
- D uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica

15 **Quale dei seguenti segni o sintomi presentano i pazienti per i quali è stata enunciata la diagnosi infermieristica "insufficiente volume di liquidi extracellulari"?**

- A ipotensione
- B accresciuto output urinario
- C diluizione delle urine
- D congestione polmonare

16 **Il catetere di Dufour è un catetere:**

- A vescicale rigido a una via indicato nelle cateterizzazioni con ipertrofie prostatiche gravi
- B vescicale semirigido autostatico a tre vie indicato per il lavaggio vescicale
- C venoso centrale per la rilevazione continua della pressione venosa centrale
- D venoso centrale per la somministrazione di soluzione parenterale a lungo termine

17 **Viene definito puerperio il periodo:**

- A compreso tra la fine dell'espulsione del feto e la ripresa dell'attività ovarica
- B compreso tra la fine del parto e la ripresa dell'attività ciclica ovarica
- C che comprende le prime due settimane dopo il parto
- D che comprende i primi tre mesi dopo il parto

18 **La corretta tenuta della documentazione infermieristica è normata da:**

- A art. 263 del C.P., art. 574 del C.P., L.462/99
- B art. 326 del C.P., art. 574 del C.P., L.462/99
- C art. 263 del C.P., art. 574 del C.P., L.675/96
- D art. 326 del C.P., art. 622 del C.P., L.675/96

19

Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, le compressioni toraciche devono:

- A avere frequenza di 120 compressioni al minuto
- B abbassare il torace di 3 – 4 cm
- C avere frequenza di 80 compressioni al minuto
- D abbassare il torace di 5 – 6 cm

PROVA B

- 20 **Nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM), è da ritenersi esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti per tutto il periodo di formazione, il personale sanitario che:**
- A frequenta corsi annuali di formazione post laurea propri del profilo di appartenenza
 - B presta servizio in strutture private
 - C non ha ancora completato il periodo di prova
 - D opera come libero professionista
- 21 **Secondo l'art. 24, Capo IV dell'attuale Codice Deontologico, l'Infermiere che presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita:**
- A riconosce l'importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure e della palliazione
 - B riconosce l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale
 - C sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto
 - D tutte le alternative precedenti
- 22 **Il trasporto del paziente è in ossigeno a 15/l min e ho una bombola di 5l a 150 atm, il viaggio quanto può durare:**
- A 5 ore
 - B 10 minuti
 - C 2 ore
 - D 50 minuti
- 23 **Qual è l'azione più corretta qualora si rompesse accidentalmente una fiala contenente un farmaco ad azione stupefacente?**
- A si scarica il farmaco registrandolo a nome del paziente che ne fa uso
 - B si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell'apposito registro
 - C non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato
 - D si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico del materiale consumato sull'apposito registro
- 24 **Quali sono i parametri che permettono di distinguere e differenziare i cateteri?**
- A calibro, materiale, consistenza, estremità distale
 - B calibro, materiale, consistenza, numero delle vie ed estremità prossimale
 - C calibro, materiale, consistenza, numero delle vie ed estremità distale
 - D calibro, materiale, diametro, numero delle vie ed estremità prossimale
- 25 **Quale dei seguenti NON è un parametro utilizzato nel punteggio di Apgar?**
- A frequenza cardiaca
 - B temperatura corporea
 - C attività respiratoria
 - D colorito cutaneo

PROVA B

- 23 **Qualè il tempo minimo necessario per un prodotto a base alcolica per eliminare la maggior parte dei germi sulle tue mani?**
- A 3 secondi
 - B 20 secondi**
 - C 1 minuto
 - D 45 secondi
- 27 **Per “validazione dei dati” si intende:**
- A la raccolta dei soli dati di stretta pertinenza infermieristica
 - B il controllo dell’accuratezza delle informazioni ottenute**
 - C l’organizzazione dei dati raccolti secondo un determinato modello teorico dell’assistenza
 - D la trasformazione di un’ipotesi diagnostica in una diagnosi infermieristica
- 28 **L’infermiera che ha elaborato la teoria dell’assistenza infermieristica come <<soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona>> è:**
- A Florence Nightingale
 - B Hildegard Peplau
 - C Virginia Henderson**
 - D Martha Rogers
- 29 **Qual è il significato della parola "concussione"?**
- A reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, ottiene denaro o vantaggi per sé o per altri.**
 - B condizione di coloro che vivono in stato coniugale senza essere sposati.
 - C l'insieme delle trattative intese a concludere un accordo.
 - D Nessuna delle alternative precedenti è corretta.
- 30 **Quale tra le seguenti misure può essere considerata come profilassi indiretta delle malattie trasmissibili?**
- A isolamento e contumacia
 - B miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ambientali**
 - C immunoprofilassi attiva
 - D notifica di malattia infettiva

- 1 **Gli elementi descritti dall' International Classification for Nursing Practice sono:**
- A i fenomeni di nursing
 - B le diagnosi infermieristiche
 - C gli interventi e i risultati dell'assistenza infermieristica
 - D i fenomeni di nursing, le azioni e i risultati dell'assistenza infermieristica
- 2 **La finalità del Nursing è, per V. Henderson, quella di assistere la persona a:**
- A riacquistare la propria indipendenza, il più rapidamente possibile
 - B la capacità di curarsi da solo
 - C l'autosomministrazione dei farmaci prescritti dal medico
 - D l'equilibrio e l'armonia con l'ambiente
- 3 **Con la locuzione "personalizzazione dell'assistenza infermieristica" in genere si intende la capacità di:**
- A pianificare l'assistenza attraverso una corretta formulazione degli obiettivi
 - B formulare una corretta diagnosi infermieristica
 - C adattare l'intervento professionale ai costituenti soggettivi che la persona esprime come portatrice di bisogni
 - D assicurare un approccio accogliente e più umano durante l'ospedalizzazione
- 4 **Qual è il meccanismo di azione dei farmaci anticoagulanti orali (TAO)?**
- A inibiscono l'azione della vitamina K
 - B esplicano attività trombo-embolica
 - C agiscono legandosi all'antitrombina III
 - D tutte le altre alternative proposte sono corrette
- 5 **Se la temperatura corporea si abbassa e si innalza significativamente 2 o più volte al giorno di oltre 1°, senza però mai tornare a valori normali, si parla di febbre ...**
- A continua
 - B ricorrente
 - C remittente
 - D intermittente
- 6 **I livelli sierici del peptide natriuretico atriale nel paziente con scompenso cardiaco cronico sono correlati con:**
- A età del paziente
 - B sesso ed età del paziente
 - C grado di danno funzionale
 - D valori di pressione sistolica
- 7 **Quali sono le variazioni emodinamiche presenti nello shock ipovolemico?**
- A ipotensione, bradicardia, resistenze periferiche normali o ridotte, bassa pressione venosa centrale
 - B ipotensione, tachicardia, resistenze periferiche aumentate, bassa pressione venosa centrale
 - C pressione arteriosa normale o aumentata, frequenza cardiaca normale o diminuita, resistenze periferiche ridotte, alta pressione venosa centrale
 - D ipotensione, tachicardia, resistenze periferiche diminuite, bassa pressione venosa centrale

8 Per "emianopsia" si intende:

- A la perdita totale della vista da un solo occhio
- B** la perdita di metà campo visivo
- C la paralisi omolaterale dei muscoli oculari
- D una forma di diplopia che colpisce un solo occhio

9 Quali dei seguenti raggruppamenti include maggiormente fattori di rischio delle lesioni da pressione?

- A obesità, attrito, età < 60, umidità, ipotermia
- B malnutrizione, attrito, età avanzata, albuminemia normale, ipertensione
- C età avanzata, umidità, obesità, ipotermia, cute idratata
- D** pressione, attrito, frizione, malnutrizione, età avanzata, umidità

10 L'evento avverso è:

- A un danno causato a un utente dalla gestione clinica e dipendente dalle sue condizioni, il quale causa la morte, una malattia che prolunga la degenza, una disabilità, o anche solo una sofferenza transitoria
- B un danno causato a un utente dalla gestione clinica e non dipendente dalle sue condizioni, il quale causa una malattia che prolunga la degenza, una disabilità o una sofferenza transitoria ma non la morte
- C** un danno causato a un utente dalla gestione clinica e non dipendente dalle sue condizioni, il quale causa la morte, una malattia che prolunga la degenza, una disabilità, o anche solo una sofferenza transitoria
- D un danno causato a un utente dalla gestione clinica e dipendente dalle sue condizioni, il quale potrebbe causare la morte, una malattia che prolunga la degenza, una disabilità o una sofferenza transitoria

11 La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali / superfici precedentemente detersi è il processo di:

- A decontaminazione
- B** disinfezione
- C detersione
- D sterilizzazione

12 Indicare, tra le seguenti, la misura raccomandata per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie, secondo il Centers for Disease Control di Atlanta (CDC).

- A nell'assistenza infermieristica alle persone cateterizzate, il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato, che si usino i guanti o meno, prima e dopo qualsiasi manipolazione del sistema di drenaggio
- B lavarsi le mani e indossare guanti puliti prima di manipolare il rubinetto di scarico dell'urina e assicurarsi che questo non venga mai a contatto con il pavimento
- C la cateterizzazione uretrale e tutte le manovre assistenziali sul catetere devono essere eseguite solo da personale qualificato
- D** tutte le altre alternative sono corrette

13 Lo standard di qualità è:

- A** il valore atteso, prestabilito, per un indicatore, secondo criteri di qualità
- B il valore numerico massimo raggiungibile
- C una variabile che non può essere descritta con un valore numerico
- D una variabile che consenta di descrivere fenomeni complessi e di prendere decisioni per ottenere o mantenere cambiamenti

14 **Quale fra le seguenti scale per la valutazione del dolore è indicata nell'anziano con deficit cognitivo?**

- A PAINAD
- B CPOT
- C BPS
- D nessuna delle alternative proposte

15 **La diagnosi infermieristica “liberazione inefficace delle vie aeree” identifica:**

- A lo stato di un individuo la cui inspirazione e/o espirazione non è adeguata
- B lo stato di un individuo con deficit di ossigenazione
- C nessuna delle altre risposte è corretta
- D lo stato di un individuo con compromissione della ventilazione spontanea

16 **Il sondino di aspirazione di Salem:**

- A ha un solo volume, fori terminali e laterali, ed è indicato per la nutrizione enterale
- B è bilume, permette la decompressione gastrica e l'ingresso di aria per evitare l'effetto vacuum sulla mucosa gastrica
- C è bilume, indicato per la somministrazione di nutrizione enterale e medicinali contemporaneamente
- D è indicato per l'aspirazione passiva delle secrezioni gastro-duodenali

17 **Secondo il “Profilo professionale dell’infermiere”, le aree previste per la formazione post-base e la pratica specialistica sono:**

- A sanità pubblica, medicina, chirurgia, pronto soccorso, area critica
- B sanità pubblica, ostetricia, pediatria, ortopedia-traumatologia, area critica
- C sanità pubblica, pediatria, psichiatria, geriatria, area critica
- D sanità pubblica, pediatria, medicina-chirurgia, geriatria, area critica

18 **Entro quanto tempo dal parto deve essere eseguita l’immunoprofilassi Rh?**

- A 24 ore
- B 36 ore
- C 76 ore
- D una settimana

19 **L’art.1 della legge n.251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica svolgono assistenza:**

- A con autonomia professionale e utilizzano metodologia di pianificazione per obiettivi
- B con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- C con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinari
- D con autonomia professionale limitata dall'ambito specifico di specializzazione

20 **Quale di queste affermazioni, relative alla formazione post-base, è vera?**

- A al corso di laurea magistrale possono accedere, previa prova di accesso selettiva, tutti gli infermieri
- B al corso di laurea magistrale possono accedere, previa prova di accesso selettiva, solo gli infermieri con laurea triennale
- C al corso di laurea magistrale possono accedere, oltre agli infermieri laureati, anche gli infermieri con diploma conseguito nelle scuole regionali, purchè in possesso di maturità quinquennale, previa prova di accesso selettiva
- D ai master universitari di primo livello possono accedere solo gli infermieri con laurea triennale

- 21 **In base all'art.18, Capo IV dell'attuale Codice Deontologico, l'infermiere:**
- A rileva, interviene e documenta il dolore dell'assistito durante il ricovero
 - B** previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura
 - C rileva e documenta il dolore dell'assistito
 - D previene, rileva e interviene sul dolore dell'assistito
- 22 **Indica quale dei seguenti comportamenti è opportuno seguire per evitare errori nella fase di somministrazione, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute:**
- A richiedere nei capitoli d'acquisto l'assenza di situazioni di rischio (lo stesso colore delle confezioni per dosaggi diversi della stessa forma farmaceutica o il nome simile)
 - B evitare prescrizioni incomplete o che generano confusione relativamente alla via di somministrazione e alla forma farmaceutica
 - C** leggere attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la concentrazione, la via di somministrazione, la scadenza, l'etichetta del farmaco, eventualmente la velocità della pompa di infusione e controllare le linee di raccordo
 - D disporre di una procedura per la conservazione dei farmaci ad "alto rischio"
- 23 **Rientrano nella definizione di etica:**
- A i diritti e i doveri, le regole e i componenti che devono essere rispettati dagli operatori sanitari e sociali
 - B** gli elementi che permettono di discernere i comportamenti umani buoni, giusti e leciti da quelli cattivi, ingiusti e illeciti
 - C gli interventi umani sull'uomo, resi leciti dalla ricerca medica e biomedica
 - D nessuna delle altre risposte è corretta
- 24 **Nel cateterismo vescicale, sono definiti "sistemi a circuito chiuso":**
- A i contenitori di raccolta
 - B i cateteri vescicali rigidi o semirigidi
 - C le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi
 - D** nessuna delle altre risposte è corretta
- 25 **Nella testa fetale la piccola fontanella è una formazione cartilagineo-membranosa in cui confluiscono:**
- A la sutura coronaria bilaterale e la sutura metopica bilaterale
 - B** i due segmenti laterali della sutura lambdoidea e la sutura sagittale
 - C la sutura coronaria bilaterale, la sutura metopica, la sutura sagittale
 - D la sutura temporale, la sutura metopica, la sutura sagittale
- 26 **Quale fra le seguenti affermazioni sulla nutrizione enterale attraverso Peg (gastrostomia endoscopica percutanea) è falsa?**
- A il set di infusione deve essere sostituito ogni 24 h
 - B è fortemente sconsigliato aggiungere farmaci alla sacca in cui è contenuta la miscela nutritiva
 - C durante la Net è necessario far assumere al paziente la posizione Fowler o semiFowler
 - D** è necessario effettuare il controllo del ristagno gastrico ogni 12 h solo nella fase di avvio della Net
- 27 **Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono:**
- A formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione
 - B raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, valutazione, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione degli interventi
 - C** raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione
 - D raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione

- 28 **Il modello teorico del Nursing proposto da Marisa Cantarelli è definito:**
- A modello delle competenze infermieristiche
 - B modello delle prestazioni infermieristiche
 - C modello delle mansioni infermieristiche
 - D modello del Nursing basato sulle prove di efficacia
- 29 **Tra le seguenti opzioni indicare la definizione del concetto di "imperizia".**
- A avere una condotta superficiale e disattenta
 - B non trascrivere i propri atti sulla documentazione clinica
 - C non saper mettere in pratica ciò che si dovrebbe aver acquisito secondo il proprio corso di studi e la propria esperienza
 - D mettere in atto presidi medico-chirurgici che vanno oltre le proprie capacità tecniche e culturali
- 30 **Quali delle seguenti affermazioni sui vaccini è corretta?**
- A non si possono somministrare nella stessa seduta vaccini diversi tranne quelli combinati in una unica preparazione
 - B per i vaccini costituiti da anatossine è sufficiente un'unica inoculazione
 - C per la preparazione del vaccino antiepatite B è utilizzata la tecnica del DNA ricombinante
 - D i vaccini uccisi hanno una efficacia protettiva maggiore di quelli vivi purché venga rispettata l'integrità genica dei virus o batteri in essi contenuti




- 1 **Nel programmare l'assistenza durante il turno di notte quale insieme di attività realizzeresti prioritariamente:**
 - A presa visione dei pazienti più complessi; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e assicurare i compiti di riordino
 - B presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici
 - C presa visione e sistemazione di tutti i pazienti ad inizio turno, garantire risposta efficiente alle chiamate dei pazienti; garantire terapie ad orario, garantire i controlli referti e registrazioni
 - D monitoraggio pazienti critici, rispondere alle chiamate dei pazienti, orari distribuzione delle terapie e tempi di posizionamento

- 2 **La scelta del tipo di medicazione in una lesione da decubito deve essere fatta in relazione a:**
 - A profondità della lesione e tipo di tessuto presente
 - B diametro della lesione e localizzazione della lesione
 - C numero totale delle lesioni
 - D diametro della lesione e colore bordi della lesione

- 3 **Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
 - A prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
 - B prima di eseguire procedure invasive
 - C come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria
 - D al termine delle attività di strumentazione peri-operatoria


- 4 **Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:**
 - A edemi declivi e turgore delle vene giugulari
 - B poliuria
 - C episodi di ipotensione ortostatica
 - D inversione del ritmo sonno veglia





PROVA A


- 5 **Nella rilevazione della pressione arteriosa mediante sfigmomanometro e fonendoscopio, per la quale sono riconosciute cinque fasi corrispondenti ai toni di Korotkoff, la pressione diastolica viene indicata dalla:**
- A quarta fase
 - B terza fase
 - C quinta fase
 - D prima fase
- 6 **La pratica della somministrazione di un farmaco include:**
- A la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
 - B la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia, del trattamento, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
 - C la preparazione, il controllo e la somministrazione
 - D la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia, del trattamento e la registrazione di effetti avversi
- 7 **Dividendo il gluteo in quattro quadranti, se si pratica una iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno è stata scelta la sede:**
- A rettofemorale
 - B deltoide
 - C ventrogluteare
 - D dorsogluteare
- 8 **Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?**
- A mezza compressa
 - B due compresse
 - C una compressa più mezza
 - D secondo indicazione medica





PROVA A


- 9 **In caso di emorragia acuta qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?**
- A anti-Trendelenburg
 - B Trendelenburg
 - C supina
 - D semi-seduta
- 10 **Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:**
- A tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37°C dopo aver superato i 39°C
 - B durante un episodio di aumento della temperatura corporea
 - C solo se la temperatura corporea supera i 39°C
 - D almeno un'ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
- 11 **Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?**
- A invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della seconda minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
 - B invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
 - C invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
 - D invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore necessariamente sterile





PROVA A


- 12 **Durante il servizio notturno in Ortopedia riscontra la caduta di un paziente. Indichi quale sequenza di comportamenti adotterebbe per gestire l'evento:**
- A allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella, documentare con scheda incident reporting
 - B soccorrere il paziente, allertare il medico, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting, avvisare i familiari
 - C soccorrere il paziente, allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting
 - D allertare il medico, soccorrere il paziente, documentare l'evento in cartella, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident reporting
- 13 **La signora Maria è ricoverata in Pneumologia per BPCO riacutizzata. Sta assumendo ossigenoterapia tramite maschera di Venturi con FiO₂ del 32%. In vista dell'assunzione del pasto è previsto il passaggio alla cannula nasale. Quale flusso di ossigeno imposterà l'infermiere con approssimazione all'unità di litro/minuto?**
- A 1 l/m
 - B 3 l/m
 - C 5 l/m
 - D 6 l/m
- 14 **Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, qual è la giusta sequenza della catena della sopravvivenza ?**
- A riconoscimento - inizio rcp - attivazione acs - uso dae
 - B riconoscimento - attivazione acs – rcp - uso dae
 - C inizio rcp – uso dae - riconoscimento – attivazione acs
 - D attivazione acs - riconoscimento – inizio rcp – uso dae





PROVA A

- 15 **Qual è tra le seguenti la più importante procedura immediata in un soggetto di 21 anni con asma bronchiale, trattato al domicilio con beta-agonisti, teofillinici e steroidi e.v., perché sintomatico da numerose ore, che si presenta in Pronto Soccorso profusamente sudato, fortemente agitato, incapace di parlare, che ripetutamente si toglie la maschera per l'ossigeno, con ipoventilazione e dispnea debolmente sibilante?**
- A trattamento corticosteroideo sistematico
 - B sodio cromoglicato per via inalatoria
 - C contatto telefonico e discussione con il medico privato per ulteriori notizie anamnestiche
 - D preparazione per l'intubazione endotracheale
- 16 **Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne. Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?**
- A paziente anziana stabile della quale mi è stato riferito che presenta perdite a livello del catetere vescicale
 - B paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita
 - C paziente di 80 anni, broncopneumopatico, con O2 a bassi flussi, che satura 91%
 - D paziente con una tracheostomia che necessita di frequenti tracheo-aspirazioni, diuresi contratta
- 17 **I siti per la rilevazione della temperatura corporea centrale sono:**
- A arteria polmonare, vescica, esofago
 - B vescica, mucosa rettale, cavo orale
 - C vescica, stomaco, arteria radiale
 - D vena cava, vescica, aorta





PROVA A

18 Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:

- A controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni
- B controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
- C controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
- D controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

19 Durante la tecnica di iniezione intradermica devi inserire l'ago con un'angolazione ...

- A compresa fra 45° e 90°
- B di 30°
- C di 90°
- D compresa fra 10° e 15°

20 Devi infondere 300 ml di soluzione di Glucosio al 5% in 10 ore. Non disponi di una pompa di infusione e il deflussore in utilizzo nel reparto presenta questa caratteristica: 20 gocce = 1 ml. A quante gocce al minuto regoli il deflussore?

- A 25 gocce/minuto
- B 10 gocce/minuto
- C 20 gocce/minuto
- D 15 gocce/minuto



NON ESTRATTA 02/10/2020

Luigi Ruban *[Signature]*

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano


PROVA B

- 1 **Per aiutare un paziente con laparotomia addominale ad espettorare le secrezioni è maggiormente utile:**
 - A fargli assumere la posizione laterale ed effettuare il clapping
 - B fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione e a contenere la lesione
 - C invitarlo a tossire tenendo il capo flesso verso il basso
 - D associare la posizione semiseduta a respiri profondi e colpi di tosse invitandolo a contenersi la lesione

- 2 **Per la determinazione del residuo urinario è indispensabile:**
 - A far bere al paziente almeno 2 litri di acqua nelle 24 ore prima della valutazione
 - B non far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
 - C applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore
 - D far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere

- 3 **Quando si effettua un'emocoltura, secondo le linee guida, è necessario disinfettare la membrana di gomma dei flaconcini contenenti brodi di coltura con alcool isopropilico 70% e lasciare asciugare?**
 - A sì, sempre. I flaconi riempiti devono poi essere tappati con tampone imbevuti dello stesso antisettico
 - B sì, sempre. I flaconi riempiti non devono però essere tappati con tampone imbevuti dello stesso antisettico
 - C no, mai. La membrana è sterile
 - D sì, ma deve essere disinfettato solo il flacone in aerobiosi

- 4 **Quali sono le complicanze minori della CPAP:**
 - A discomfort, agitazione, secchezza nasale, lesioni vie aeree
 - B discomfort, lesioni cutanee, arresto respiratorio, irritazione oculare
 - C scarso adattamento, ipotensione, arresto respiratorio, secchezza nasale
 - D irritazione oculare, secchezza nasale, ansia, claustrofobia




PROVA B

- 5 **Un familiare chiama l'ambulatorio infermieristico per sapere quale sarà l'autonomia della bombola contenente ossigeno gassoso compresso se la sua capacità è di 5 L, la pressione è pari a 150 Atm e il flusso impostato è di 3 l/m?**
- A circa 4 ore
B circa 3 ore
C circa 5 ore
D circa 2 ore
- 6 **Per quanto tempo può essere sospesa la manovra di rianimazione cardio polmonare?**
- A 15 secondi
B 5 secondi
C 10 secondi
D 1 minuto
- 7 **Di una emorragia venosa, quale tra le seguenti misure terapeutiche è preferibile nel trattamento di urgenza?**
- A applicazione di un laccio a valle rispetto alla sede del sanguinamento
B pressione diretta sulla sede della lesione senza guanti
C applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
D esposizione chirurgica del vaso
- 8 **La corretta dimensione della cannula oro faringea viene determinata in base alla distanza tra:**
- A angolo del naso e punta della mandibola
B angolo della bocca e punta del lobo dell'orecchio
C angolo della bocca e angolo mandibolare
D incisura intercricoidea e punta del naso



PROVA B

- 9 **In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani?**
- A prima di una qualsiasi procedura
 - B prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso
 - C prima del contatto diretto con un paziente
 - D dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano
- 10 **Quale arteria viene utilizzata per confezionare la fistola arterovenosa in dialisi?**
- A arteria ulnare
 - B arteria radiale
 - C arteria brachiale
 - D arteria succlavia
- 11 **La somministrazione di un farmaco prevede:**
- A la registrazione della prescrizione e la regola delle 7G
 - B il nome del farmaco, il dosaggio, il rispetto della via di somministrazione e la frequenza di assunzione
 - C la registrazione della prescrizione e la regola delle 8G
 - D l'accertamento del nome del farmaco, il dosaggio e il rispetto delle via di somministrazione
- 12 **Quale sede è consigliata per la somministrazione di vaccini e immunoglobuline tramite l'iniezione intramuscolare?**
- A vastolaterale
 - B deltoidea
 - C ventroglutea
 - D dorsoglutea




PROVA B

- 13 **Devi somministrare 0.2 mg di Lanitop® (metildigossina) e disponi del preparato in gocce da 0.6 mg/ml; dal foglietto illustrativo si ricava che il contagocce della preparazione fornisce 1 ml di soluzione ogni 45 gocce. Quante gocce dovranno essere somministrate?**
- A 18 gtt
 - B 10 gtt
 - C 22 gtt
 - D 15 gtt
- 14 **Paziente iperteso con epistassi: l'infermiere si preoccupa di garantire una posizione:**
- A capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso
 - B capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda
 - C capo chino in avanti posizionando sotto il mento una arcella per valutare l'entità della perdita ematica
 - D posizionare il paziente disteso supino in posizione di Trendelenburg
- 15 **Nel calcolo del bilancio idrico, la cosiddetta "acqua di ossidazione" viene considerata:**
- A un input, poiché rappresenta la quota di acqua endogena prodotta dall'organismo a causa dei processi metabolici
 - B un input perché rappresenta una quota di acqua introdotta per infusione nell'organismo
 - C un output, poiché rappresenta il prodotto dell'iperventilazione
 - D un output, poiché rappresenta la quota di acqua sottratta all'organismo a causa dei processi metabolici



PROVA B

- 16 **Una sola delle seguenti affermazioni relative all'esecuzione di un tampone faringeo è errata. Quale?**
- A si può utilizzare un abbassalingua per evitare la contaminazione del tampone
 - B bisogna raggiungere la parte posteriore del cavo faringeo lungo l'area tonsillare
 - C si deve eseguire questa manovra con tecnica sterile
 - D l'infermiere deve indossare guanti sterili
- 17 **Qual è la principale controindicazione all'applicazione della CPAP in un paziente in edema polmonare cardiogenico?**
- A la presenza di una pressione sistolica < 140 mmHg
 - B la presenza di shock cardiogeno
 - C la presenza di un pH < 7.35
 - D un'età > 80 anni
- 18 **Il caregiver del signor Mario, affetto da incontinenza urinaria, riferisce all'infermiere delle cure domiciliari che da alcuni giorni ha riscontrato la presenza in sede inguinale di un leggero arrossamento con cute integra e discomfort. Dopo l'igiene intima, l'infermiere può suggerire di applicare:**
- A crema barriera a base di ossido di zinco ed intensificare il cambio del pannolone
 - B crema antifunginea e posizionare garze tra le pieghe inguinali
 - C toccatura topica con violetto di genziana e lasciare scoperta la zona
 - D antisettico locale e posizionare una traversa assorbente monouso
- 19 **Qual è il monitoraggio essenziale per un paziente in CPAP?**
- A T°, RR, FC, NIBP, EGA
 - B Ecoocardiocolordoppler, RR, FC, NIBP, EGA
 - C EGA, diuresi, RR, FC, NIBP
 - D Stato di coscienza, RR, FC, NIBP, EGA



PROVA B

20 Definire la corretta sequenza delle priorità da seguire, trovandosi di fronte ad un paziente ricoverato per emorragia gastroenterica che presenta improvvisamente pallore, sudorazione profusa e fredda, tachicardia, agitazione psicomotoria: A) assicurarsi della disponibilità di sangue compatibile o eseguire prelievo per prove crociate – B) assicurarsi un accesso venoso prima che la pressione arteriosa diminuisca – C) chiamare il medico e preparare la terapia necessaria.

A C A B

B B C A

C A C B

D A B C



NON ESTRATTA 02/10/2020

Dugli Roberto
Mazzucchi

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano


PROVA C

- 1 **Se il monitor cardiaco va in allarme si deve:**
 - A verificare i collegamenti e valutare clinicamente il paziente
 - B vedere il colorito cutaneo del paziente e rilevare il polso radiale
 - C chiamare subito il medico
 - D spegnere gli allarmi

- 2 **Quali dei seguenti segni deve saper riferire un paziente in terapia con anticoagulanti per via orale?**
 - A difficoltà alla deglutizione e odinofagia
 - B riniti, crisi asmatiche
 - C sanguinamento gengivale, ematuria, epistassi
 - D nevralgie, parestesie

- 3 **Qual è la % di fallimento della NIV in corso di insufficienza respiratoria ipossica secondaria a polmonite comunitaria?**
 - A 60%
 - B 10%
 - C 30%
 - D 80%

- 4 **Controindicazioni all'utilizzo di una CPAP:**
 - A alterazione della coscienza, ipercapnia severa, vomito, PNX
 - B traumi facciali, apnea, paziente incosciente, ipossia
 - C vomito, apnea, claustrofobia, ipossia
 - D apnea, ipossia, trauma facciale claustrofobia



PROVA C

- 5 **Nell'esecuzione dell'ECG, l'elettrodo per la derivazione precordiale V6 va posizionato:**
- A nel quarto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
 - B nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
 - C nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare media
 - D nel sesto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare posteriore
- 6 **Definisce "ipossia":**
- A una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - B una condizione in cui prevale un metabolismo aerobico
 - C una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - D una pressione di CO₂ al di sopra di 40 mmHg
- 7 **Quali interventi attueresti in caso di reazione alla trasfusione?**
- A interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare sacca e set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio di trasfusione per gli accertamenti
 - B rallentare la somministrazione, avvisare il medico, se conferma la reazione sospendere la somministrazione e inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti
 - C interrompere la somministrazione, avvisare il medico, conservare sacca e set e inviarla al servizio trasfusionale, controllare se nella sacca è presente emoagglutinazione
 - D rallentare la somministrazione, avvisare il medico per impostare una terapia, inviare sacca e set al servizio trasfusionale per gli accertamenti





PROVA C

- 8 **L'infermiere dispone di un flaconcino da 100 ml di Tachipirina al 2,5%, il medico prescrive di somministrare 500 mg di farmaco. Quanti ml somministrerà l'infermiere?**
- A 20 ml
 - B 15 ml
 - C 5 ml
 - D 10 ml
- 9 **Quali delle seguenti opzioni rappresenta il metodo più corretto per il calcolo delle "entrate" nel bilancio idrico?**
- A liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa, salivazione
 - B liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa e via enterale, salivazione
 - C liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa e via enterale, acqua metabolica
 - D liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa e via enterale
- 10 **Il Pronto Soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzioni dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione della malattia?**
- A indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogni qual volta abbia contatti con la persona, programmare interventi di pulizia straordinaria per la stanza di degenza e, se possibile, accoglierla in una stanza singola
 - B metterlo subito in isolamento ed evitare qualsiasi tipo di contatto
 - C indossare i mezzi di protezione previsti dall'isolamento per contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire
 - D nessuno, in quanto la scabbia non è una patologia contagiosa





PROVA C

- 11 L'infermiere sta assistendo un paziente con una grave dispnea sottoposto ad ossigenoterapia tramite una maschera di Venturi. Cosa dovrebbe fare l'infermiere mentre assiste questo paziente?**
- A verificare frequentemente per l'instaurarsi di secchezza della mucosa nasale
 - B mantenere la maschera ben aderente al viso del paziente
 - C monitorare i livelli di saturazione dell'ossigeno durante i pasti
 - D nessuna delle risposte precedenti è corretta
- 12 Un paziente è sottoposto a nutrizione parenterale totale (NPT) tramite un catetere venoso centrale. Gli viene inoltre prescritto un antibiotico da somministrare per via endovenosa. Quale delle seguenti azioni deve compiere l'infermiere prima di somministrare la terapia antibiotica?**
- A posizionare un accesso venoso separato per la somministrazione dell'antibiotico
 - B sospendere la NPT per 30 minuti prima di somministrare l'antibiotico
 - C eseguire un lavaggio con 50 ml di soluzione fisiologica prima di somministrare l'antibiotico
 - D aggiungere l'antibiotico direttamente nella sacca della NPT
- 13 L'infermiere inserisce un catetere vescicale di tipo Foley ad un paziente che presenta globo vescicale. Dopo aver riaccordato il catetere alla sacca, l'infermiere nota che la sacca si riempie velocemente fino a 800 ml di urina. Qual è l'intervento infermieristico appropriato per la sicurezza del paziente?**
- A clampare il tubo di raccordo tra catetere e sacca di raccolta della diuresi per 30 minuti, quindi lasciar nuovamente defluire l'urina
 - B effettuare una pressione sovrapubica per mantenere un flusso costante di urina
 - C sollevare la sacca di raccolta ad un'altezza sufficiente per rallentare la velocità di deflusso dell'urina
 - D nessuna delle alternative precedenti





PROVA C

- 14 **Due ore dopo un intervento di gastrectomia subtotale l'infermiere identifica che il liquido drenato dal sondino naso gastrico è di colore rosso chiaro. Quale intervento prioritario deve mettere in atto l'infermiere?**
- A avvisare il medico
 - B constatare che è un evento normale
 - C irrigare il sondino naso gastrico con fisiologica ghiacciata
 - D nessuna delle alternative precedenti
- 15 **Il caregiver del signor Luigi, affetto da demenza di livello moderato, riferisce all'infermiere delle cure domiciliari che il paziente si alimenta ma da alcuni giorni fa fatica a bere e tossisce all'assunzione di liquidi. Quali indicazioni potrebbe fornire l'infermiere per facilitare l'assunzione di liquidi?**
- A capo rivolto all'indietro, addensare i liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adattato riempito in minima quantità
 - B capo rivolto in avanti, addensare i liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adattato riempito almeno per tre quarti
 - C capo rivolto in avanti, preferire spremute o succhi di frutta concentrati, utilizzare una cannucchia
 - D capo eretto e allineato, utilizzare uno schizzettone da posizionare a lato della bocca per dare piccole dosi di liquidi
- 16 **Quale azione infermieristica è importante durante l'aspirazione delle secrezioni ad un paziente con tracheostomia?**
- A iniziare l'aspirazione quando il catetere viene ritirato
 - B inserire il catetere fino a quando il riflesso della tosse viene stimolato
 - C rimuovere la cannula interna prima di inserire il catetere di aspirazione
 - D nessuna delle alternative precedenti è corretta





PROVA C

- 17 **Un paziente è in difficoltà nell'uso dello spirometro incentivante. Nell'insegnamento al paziente, quale delle seguenti viene indicata dall'infermiere come un'azione che può interferire con l'uso efficace dello spirometro?**
- A respirare attraverso il naso
 - B stringere le labbra attorno al boccaglio
 - C togliere il boccaglio per espirare
 - D tutte le precedenti
- 18 **Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?**
- A il respiro
 - B la pervietà delle prime vie aeree
 - C il polso carotideo
 - D la risposta alla chiamata o allo stimolo doloroso
- 19 **Qual è l'intervento infermieristico prioritario per un paziente nell'immediato post operatorio?**
- A monitorare i parametri vitali
 - B osservare la comparsa di emorragie
 - C mantenere la pervietà delle vie aeree
 - D mantenere costante la temperatura corporea
- 20 **I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:**
- A Gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
 - B I contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
 - C Gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni
 - D Le misure immediate che devono essere attuate in caso di esposizione professionale a materiale biologico attraverso punture, tagli o contaminazione su cute lesa o mucose



PROVA A

- 1 **Nel programmare l'assistenza durante il turno di notte quale insieme di attività realizzeresti prioritariamente:**
 - A presa visione dei pazienti più complessi; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e assicurare i compiti di riordino
 - B** presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici
 - C presa visione e sistemazione di tutti i pazienti ad inizio turno, garantire risposta efficiente alle chiamate dei pazienti; garantire terapie ad orario, garantire i controlli referti e registrazioni
 - D monitoraggio pazienti critici, rispondere alle chiamate dei pazienti, orari distribuzione delle terapie e tempi di posizionamento
- 2 **La scelta del tipo di medicazione in una lesione da decubito deve essere fatta in relazione a:**
 - A** profondità della lesione e tipo di tessuto presente
 - B diametro della lesione e localizzazione della lesione
 - C numero totale delle lesioni
 - D diametro della lesione e colore bordi della lesione
- 3 **Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
 - A prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
 - B** prima di eseguire procedure invasive
 - C come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria
 - D al termine delle attività di strumentazione peri-operatoria
- 4 **Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:**
 - A** edemi declivi e turgore delle vene giugulari
 - B poliuria
 - C episodi di ipotensione ortostatica
 - D inversione del ritmo sonno veglia
- 5 **Nella rilevazione della pressione arteriosa mediante sfigmomanometro e fonendoscopio, per la quale sono riconosciute cinque fasi corrispondenti ai toni di Korotkoff, la pressione diastolica viene indicata dalla:**
 - A quarta fase
 - B terza fase
 - C** quinta fase
 - D prima fase
- 6 **La pratica della somministrazione di un farmaco include:**
 - A** la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
 - B** la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia, del trattamento, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
 - C** la preparazione, il controllo e la somministrazione
 - D** la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia, del trattamento e la registrazione di effetti avversi

PROVA A

- 7 **Dividendo il gluteo in quattro quadranti, se si pratica una iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno è stata scelta la sede:**
- A rettofemorale
 - B deltoide
 - C ventrogluteare
 - D dorsogluteare**
- 8 **Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?**
- A** mezza compressa
 - B due compresse
 - C una compressa più mezza
 - D secondo indicazione medica
- 9 **In caso di emorragia acuta qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?**
- A anti-Trendelenburg
 - B** Trendelenburg
 - C supina
 - D semi-seduta
- 10 **Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:**
- A tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37°C dopo aver superato i 39°C
 - B** durante un episodio di aumento della temperatura corporea
 - C solo se la temperatura corporea supera i 39°C
 - D almeno un'ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
- 11 **Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?**
- A invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della seconda minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
 - B invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
 - C** invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
 - D invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore necessariamente sterile
- 12 **Durante il servizio notturno in Ortopedia riscontra la caduta di un paziente. Indichi quale sequenza di comportamenti adotterebbe per gestire l'evento:**
- A** allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella, documentare con scheda incident reporting
 - B** soccorrere il paziente, allertare il medico, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting, avvisare i familiari
 - C** soccorrere il paziente, allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l'evento in cartella, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting
 - D** allertare il medico, soccorrere il paziente, documentare l'evento in cartella, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident reporting

PROVA A

- 13 La signora Maria è ricoverata in Pneumologia per BPCO riacutizzata. Sta assumendo ossigenoterapia tramite maschera di Venturi con FiO₂ del 32%. In vista dell'assunzione del pasto è previsto il passaggio alla cannula nasale. Quale flusso di ossigeno imposterà l'infermiere con approssimazione all'unità di litro/minuto?
- A 1 l/m
 - B 3 l/m**
 - C 5 l/m
 - D 6 l/m
- 14 Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, qual è la giusta sequenza della catena della sopravvivenza ?
- A** riconoscimento - inizio rcp - attivazione acs - uso dae
 - B riconoscimento - attivazione acs – rcp - uso dae
 - C inizio rcp – uso dae - riconoscimento – attivazione acs
 - D attivazione acs - riconoscimento – inizio rcp – uso dae
- 15 Qual è tra le seguenti la più importante procedura immediata in un soggetto di 21 anni con asma bronchiale, trattato al domicilio con beta-agonisti, teofillinici e steroidi e.v., perché sintomatico da numerose ore, che si presenta in Pronto Soccorso profusamente sudato, fortemente agitato, incapace di parlare, che ripetutamente si toglie la maschera per l'ossigeno, con ipoventilazione e dispnea debolmente sibilante?
- A trattamento corticosteroidico sistematico
 - B sodio cromoglicato per via inalatoria
 - C contatto telefonico e discussione con il medico privato per ulteriori notizie anamnestiche
 - D** preparazione per l'intubazione endotracheale
- 16 Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne. Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?
- A paziente anziana stabile della quale mi è stato riferito che presenta perdite a livello del catetere vescicale
 - B** paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita
 - C paziente di 80 anni, broncopneumopatico, con O₂ a bassi flussi, che satura 91%
 - D paziente con una tracheostomia che necessita di frequenti tracheo-aspirazioni, diuresi contratta
- 17 I siti per la rilevazione della temperatura corporea centrale sono:
- A** arteria polmonare, vescica, esofago
 - B vescica, mucosa rettale, cavo orale
 - C vescica, stomaco, arteria radiale
 - D vena cava, vescica, aorta
- 18 Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:
- A** controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni
 - B controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
 - C controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
 - D controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

PROVA A

- 19 Durante la tecnica di iniezione intradermica devi inserire l'ago con un'angolazione ...
- A compresa fra 45° e 90°
 - B di 30°
 - C di 90°
 - D** compresa fra 10° e 15°
- 20 Devi infondere 300 ml di soluzione di Glucosio al 5% in 10 ore. Non disponi di una pompa di infusione e il deflussore in utilizzo nel reparto presenta questa caratteristica:
20 gocce = 1 ml. A quante gocce al minuto regoli il deflussore?
- A 25 gocce/minuto
 - B** 10 gocce/minuto
 - C 20 gocce/minuto
 - D 15 gocce/minuto

PROVA B

- 1 **Per aiutare un paziente con laparotomia addominale ad espettorare le secrezioni è maggiormente utile:**
 - A fargli assumere la posizione laterale ed effettuare il clapping
 - B fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione e a contenere la lesione
 - C invitarlo a tossire tenendo il capo flesso verso il basso
 - D** associare la posizione semiseduta a respiri profondi e colpi di tosse invitandolo a contenersi la lesione
- 2 **Per la determinazione del residuo urinario è indispensabile:**
 - A far bere al paziente almeno 2 litri di acqua nelle 24 ore prima della valutazione
 - B non far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
 - C applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore
 - D** far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
- 3 **Quando si effettua un'emocoltura, secondo le linee guida, è necessario disinfettare la membrana di gomma dei flaconcini contenenti brodi di coltura con alcool isopropilico 70% e lasciare asciugare?**
 - A sì, sempre. I flaconi riempiti devono poi essere tappati con tampone imbevuti dello stesso antisettico
 - B** sì, sempre. I flaconi riempiti non devono però essere tappati con tampone imbevuti dello stesso antisettico
 - C no, mai. La membrana è sterile
 - D sì, ma deve essere disinfettato solo il flacone in aerobiosi
- 4 **Quali sono le complicanze minori della CPAP:**
 - A discomfort, agitazione, secchezza nasale, lesioni vie aeree
 - B discomfort, lesioni cutanee, arresto respiratorio, irritazione oculare
 - C scarso adattamento, ipotensione, arresto respiratorio, secchezza nasale
 - D** irritazione oculare, secchezza nasale, ansia, claustrofobia
- 5 **Un familiare chiama l'ambulatorio infermieristico per sapere quale sarà l'autonomia della bombola contenente ossigeno gassoso compresso se la sua capacità è di 5 L, la pressione è pari a 150 Atm e il flusso impostato è di 3 l/m?**
 - A** circa 4 ore
 - B circa 3 ore
 - C circa 5 ore
 - D circa 2 ore
- 6 **Per quanto tempo può essere sospesa la manovra di rianimazione cardio polmonare?**
 - A 15 secondi
 - B 5 secondi
 - C** 10 secondi
 - D 1 minuto
- 7 **Di una emorragia venosa, quale tra le seguenti misure terapeutiche è preferibile nel trattamento di urgenza?**
 - A** applicazione di un laccio a valle rispetto alla sede del sanguinamento
 - B pressione diretta sulla sede della lesione senza guanti
 - C applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
 - D esposizione chirurgica del vaso

PROVA B

- 8 **La corretta dimensione della cannula oro faringea viene determinata in base alla distanza tra:**
- A angolo del naso e punta della mandibola
 - B** angolo della bocca e punta del lobo dell'orecchio
 - C angolo della bocca e angolo mandibolare
 - D incisura interplicioidea e punta del naso
- 9 **In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani?**
- A prima di una qualsiasi procedura
 - B** prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso
 - C prima del contatto diretto con un paziente
 - D dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano
- 10 **Quale arteria viene utilizzata per confezionare la fistola arterovenosa in dialisi?**
- A arteria ulnare
 - B** arteria radiale
 - C arteria brachiale
 - D arteria succlavia
- 11 **La somministrazione di un farmaco prevede:**
- A** la registrazione della prescrizione e la regola delle 7G
 - B il nome del farmaco, il dosaggio, il rispetto della via di somministrazione e la frequenza di assunzione
 - C la registrazione della prescrizione e la regola delle 8G
 - D l'accertamento del nome del farmaco, il dosaggio e il rispetto delle via di somministrazione
- 12 **Quale sede è consigliata per la somministrazione di vaccini e immunoglobuline tramite l'iniezione intramuscolare?**
- A vastolaterale
 - B** deltoidea
 - C ventroglutea
 - D dorsoglutea
- 13 **Devi somministrare 0.2 mg di Lanitop® (metildigossina) e disponi del preparato in gocce da 0.6 mg/ml; dal foglietto illustrativo si ricava che il contagocce della preparazione fornisce 1 ml di soluzione ogni 45 gocce. Quante gocce dovranno essere somministrate?**
- A 18 gtt
 - B 10 gtt
 - C 22 gtt
 - D** 15 gtt
- 14 **Paziente iperteso con epistassi: l'infermiere si preoccupa di garantire una posizione:**
- A capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso
 - B capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda
 - C** capo chino in avanti posizionando sotto il mento una arcella per valutare l'entità della perdita ematica
 - D posizionare il paziente disteso supino in posizione di Trendelenburg

PROVA B

- 15 Nel calcolo del bilancio idrico, la cosiddetta "acqua di ossidazione" viene considerata:
- A un input, poiché rappresenta la quota di acqua endogena prodotta dall'organismo a causa dei processi metabolici
 - B un input perché rappresenta una quota di acqua introdotta per infusione nell'organismo
 - C un output, poiché rappresenta il prodotto dell'iperventilazione
 - D un output, poiché rappresenta la quota di acqua sottratta all'organismo a causa dei processi metabolici
- 16 Una sola delle seguenti affermazioni relative all'esecuzione di un tampone faringeo è errata. Quale?
- A si può utilizzare un abbassalingua per evitare la contaminazione del tampone
 - B bisogna raggiungere la parte posteriore del cavo faringeo lungo l'area tonsillare
 - C si deve eseguire questa manovra con tecnica sterile
 - D l'infermiere deve indossare guanti sterili
- 17 Qual è la principale controindicazione all'applicazione della CPAP in un paziente in edema polmonare cardiogenico?
- A La presenza di una pressione sistolica < 140 mmHg
 - B La presenza di shock cardiogeno
 - C La presenza di un pH < 7.35
 - D Un'età > 80 anni
- 18 Il care giver del signor Mario, affetto da incontinenza urinaria, riferisce all'infermiere delle cure domiciliari che da alcuni giorni ha riscontrato la presenza in sede inguinale di un leggero arrossamento con cute integra e discomfort. Dopo l'igiene intima, l'infermiere può suggerire di applicare:
- A crema barriera a base di ossido di zinco ed intensificare il cambio del pannolone
 - B crema antifunginea e posizionare garze tra le pieghe inguinali
 - C toccatura topica con violetto di genziana e lasciare scoperta la zona
 - D antisettico locale e posizionare una traversa assorbente monouso
- 19 Qual è il monitoraggio essenziale per un paziente in CPAP?
- A T°, RR, FR, NIBP, EGA
 - B Ecocardiocolordoppler, RR, FC, NIBP, EGA
 - C EGA, diuresi, RR, FC, NIBP
 - D Stato di coscienza, RR, FC, NIBP, EGA
- 20 Definire la corretta sequenza delle priorità da seguire, trovandosi di fronte ad un paziente ricoverato per emorragia gastroenterica che presenta improvvisamente pallore, sudorazione profusa e fredda, tachicardia, agitazione psicomotoria: A) assicurarsi della disponibilità di sangue compatibile o eseguire prelievo per prove crociate – B) assicurarsi un accesso venoso prima che la pressione arteriosa diminuisca – C) chiamare il medico e preparare la terapia necessaria
- A C A B
 - B B C A
 - C A C B
 - D A B C

PROVA C

1 **Se il monitor cardiaco va in allarme si deve:**

- A verificare i collegamenti e valutare clinicamente il paziente
- B vedere il colorito cutaneo del paziente e rilevare il polso radiale
- C chiamare subito il medico
- D spegnere gli allarmi

2 **Quali dei seguenti segni deve saper riferire un paziente in terapia con anticoagulanti per via orale?**

- A difficoltà alla deglutizione e odinofagia
- B riniti, crisi asmatiche
- C sanguinamento gengivale, ematuria, epistassi
- D nevralgie, parestesie

3 **Qual è la % di fallimento della NIV in corso di insufficienza respiratoria ipossica secondaria a polmonite comunitaria?**

- A 60%
- B 10%
- C 30%
- D 80%

4 **Controindicazioni all'utilizzo di una CPAP**

- A alterazione della coscienza, ipercapnia severa, vomito, PNX
- B traumi facciali, apnea, paziente incosciente, ipossia
- C vomito, apnea, claustrofobia, ipossia
- D apnea, ipossia, trauma facciale, claustrofobia

5 **Nell'esecuzione dell'ECG, l'elettrodo per la derivazione precordiale V6 va posizionato:**

- A nel quarto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
- B nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
- C nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare media
- D nel sesto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare posteriore

PROVA C

6 **Definisce "ipossia":**

- A una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
- B una condizione in cui prevale un metabolismo aerobico
- C** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
- D una pressione di Co₂ al di sopra di 40 mmHg

7 **Quali interventi attueresti in caso di reazione alla trasfusione?**

- A** interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare sacca e set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio di trasfusione per gli accertamenti
- B rallentare la somministrazione, avvisare il medico, se conferma la reazione sospendere la somministrazione e inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti
- C interrompere la somministrazione, avvisare il medico, conservare sacca e set e inviarla al servizio trasfusionale, controllare se nella sacca è presente emoagglutinazione
- D rallentare la somministrazione, avvisare il medico per impostare una terapia, inviare sacca e set al servizio trasfusionale per gli accertamenti

8 **L'infermiere dispone di un flaconcino da 100 ml di Tachipirina al 2,5%, il medico prescrive di somministrare 500 mg di farmaco. Quanti ml somministrerà l'infermiere?**

- A** 20 ml
- B 15 ml
- C 5 ml
- D 10 ml

9 **Quali delle seguenti opzioni rappresenta il metodo più corretto per il calcolo delle "entrate" nel bilancio idrico?**

- A liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa, salivazione
- B liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa e via enterale, salivazione
- C** liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa e via enterale, acqua metabolica
- D liquidi e cibi assunti per os, liquidi per via endovenosa e via enterale

PROVA C

- 10 **Il Pronto Soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzioni dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione della malattia?**
- A** indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogni qual volta abbia contatti con la persona, programmare interventi di pulizia straordinaria per la stanza di degenza e, se possibile, accoglierla in una stanza singola
 - B metterlo subito in isolamento ed evitare qualsiasi tipo di contatto
 - C indossare i mezzi di protezione previsti dall'isolamento per contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire
 - D nessuno, in quanto la scabbia non è una patologia contagiosa
- 11 **L'infermiere sta assistendo un paziente con una grave dispnea sottoposto ad ossigenoterapia tramite una maschera di Venturi. Cosa dovrebbe fare l'infermiere mentre assiste questo paziente?**
- A verificare frequentemente per l'instaurarsi di secchezza della mucosa nasale
 - B mantenere la maschera ben aderente al viso del paziente
 - C** monitorare i livelli di saturazione dell'ossigeno durante i pasti
 - D nessuna delle risposte precedenti è corretta
- 12 **Un paziente è sottoposto a nutrizione parenterale totale (NPT) tramite un catetere venoso centrale. Gli viene inoltre prescritto un antibiotico da somministrare per via endovenosa. Quale delle seguenti azioni deve compiere l'infermiere prima di somministrare la terapia antibiotica?**
- A** posizionare un accesso venoso separato per la somministrazione dell'antibiotico
 - B sospendere la NPT per 30 minuti prima di somministrare l'antibiotico
 - C eseguire un lavaggio con 50 ml di soluzione fisiologica prima di somministrare l'antibiotico
 - D aggiungere l'antibiotico direttamente nella sacca della NPT
- 13 **L'infermiere inserisce un catetere vescicale di tipo Foley ad un paziente che presenta globo vescicale. Dopo aver raccordato il catetere alla sacca, l'infermiere nota che la sacca si riempie velocemente fino a 800 ml di urina. Qual è l'intervento infermieristico appropriato per la sicurezza del paziente?**
- A** clampare il tubo di raccordo tra catetere e sacca di raccolta della diuresi per 30 minuti, quindi lasciar nuovamente defluire l'urina
 - B effettuare una pressione sovrapubica per mantenere un flusso costante di urina
 - C sollevare la sacca di raccolta ad un'altezza sufficiente per rallentare la velocità di deflusso dell'urina
 - D nessuna delle alternative precedenti

PROVA C

- 14 **Due ore dopo un intervento di gastrectomia subtotale l'infermiere identifica che il liquido drenato dal sondino naso gastrico è di colore rosso chiaro. Quale intervento prioritario deve mettere in atto l'infermiere?**
- A avvisare il medico
 - B** constatare che è un evento normale
 - C irrigare il sondino naso gastrico con fisiologica ghiacciata
 - D nessuna delle alternative precedenti
- 15 **Il care giver del signor Luigi, affetto da demenza di livello moderato, riferisce all'infermiere delle cure domiciliari che il paziente si alimenta ma da alcuni giorni fa fatica a bere e tossisce all'assunzione di liquidi. Quali indicazioni potrebbe fornire l'infermiere per facilitare l'assunzione di liquidi?**
- A capo rivolto all'indietro, addensare i liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adattato riempito in minima quantità
 - B** capo rivolto in avanti, addensare i liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adattato riempito almeno per tre quarti
 - C capo rivolto in avanti, preferire spremute o succhi di frutta concentrati, utilizzare una cannuccia
 - D capo eretto e allineato, utilizzare uno schizzettone da posizionare a lato della bocca per dare piccole dosi di liquidi
- 16 **Quale azione infermieristica è importante durante l'aspirazione delle secrezioni ad un paziente con tracheostomia?**
- A** iniziare l'aspirazione quando il catetere viene ritirato
 - B inserire il catetere fino a quando il riflesso della tosse viene stimolato
 - C rimuovere la cannula interna prima di inserire il catetere di aspirazione
 - D nessuna delle alternative precedenti è corretta
- 17 **Un paziente è in difficoltà nell'uso dello spirometro incentivante. Nell'insegnamento al paziente, quale delle seguenti viene indicata dall'infermiere come un'azione che può interferire con l'uso efficace dello spirometro?**
- A** respirare attraverso il naso
 - B stringere le labbra attorno al boccaglio
 - C togliere il boccaglio per espirare
 - D tutte le precedenti

PROVA C

18 Qual è la **PRIMA COSA** da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?

- A il respiro
- B la pervietà delle prime vie aeree
- C il polso carotideo
- D** la risposta alla chiamata o allo stimolo doloroso

19 Qual è l'intervento infermieristico prioritario per un paziente nell'immediato post operatorio?

- A monitorare i parametri vitali
- B osservare la comparsa di emorragie
- C** mantenere la pervietà delle vie aeree
- D mantenere costante la temperatura corporea

20 I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- A Gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- B I contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- C** Gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni
- D Le misure immediate che devono essere attuate in caso di esposizione professionale a materiale biologico attraverso punture, tagli o contaminazione su cute lesa o mucose