

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

titolo	classe	sottoclasse	categoria
1	4	2	2

Fascicolo 16/2021

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMIANTO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE (CAT. D): PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

La Commissione rileva che per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si deve fare riferimento agli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/01, e che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 15 punti per i titoli di carriera;
- 2 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- 10 punti per curriculum formativo e professionale.

Il superamento della prova scritta e l'ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell'ambito dell'unica seduta prevista, è in ogni caso subordinata all'avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l'aver sostenuto la prova pratica

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20 nella prova pratica.

L'idoneità alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

Ai fini della graduatoria il punteggio conseguito in ciascuna prova di esame sarà sommato a quello riportato nella valutazione dei titoli, il totale così ottenuto rappresenterà la votazione complessiva di ogni candidato.

Handwritten signatures and initials:
LPO, [unclear], ai

Il giorno venerdì 11 ottobre 2021 alle ore 8.00 presso il PalaDesio - (PalaBancoDesio) Palazzetto dello Sport della Città di Desio situato in Largo Atleti Azzurri D'Italia, 20832 Desio (MB) - si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D), indetto con deliberazione n. 266 del 31 marzo 2021.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 759 del 9 settembre 2021, fascicolo 16/2021 è così composta e ritualmente convocata:

dott. Gianfranco Galli	Dirigente Responsabile SITRA Presidente titolare;
dott.ssa Giuliana Pieraccini	Collaboratore professionale sanitario senior – infermiere – cat. Ds Componente titolare;
dott.ssa Francesca Marrone	Collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D Componente titolare;
dott.ssa Martina Santambrogio	Assistente amministrativo – cat. C Segretario della Commissione.

I testi e criteri di valutazione delle prove concorsuali, sono i seguenti:

PROVA SCRITTA

La commissione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 220/2001 e di quanto indicato sul bando concorsuale - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27 settembre 2019 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, stabilisce che la prova scritta verrà formulata *“su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla”*.

La prova scritta è segreta, quindi il candidato non dovrà firmarla, non dovrà indicarvi i propri dati identificativi né alcun segno che possa essere ritenuto motivo di riconoscimento (modulo risposte); per lo stesso motivo si dovrà usare esclusivamente la biro fornita.

La Commissione ha predisposto una terna di prove costituita da 3 test a risposta multipla.

Ogni **test è composto da 30 domande** e ciascuna domanda è corredata da 4 possibili risposte.

Tenuto conto che il punteggio per la valutazione della prova scritta, come previsto dal, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, è in trentesimi e che per il conseguimento dell'idoneità il **punteggio** minimo è di 21 punti su 30, la commissione stabilisce di valutare le prove con il seguente criterio:

la soglia minima per il raggiungimento dell'idoneità sarà di 21 risposte esatte pari a 21 punti; ad ogni ulteriore risposta corretta verrà attribuito 1 punto fino a raggiungere il massimo di 30, secondo lo schema sottostante:

Risposte esatte	Punteggio su 30
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30

I quesiti senza risposta e le risposte errate non comportano detrazione di punteggio, il loro valore quindi è zero.

I tre test, tra cui è stato estratto quello che ha costituito l'oggetto d'esame uguale per tutti, sono i seguenti:

PROVA SCRITTA A

(allegata prova scritta A + griglia correzione prova scritta A- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA SCRITTA B

(allegata prova scritta B + griglia correzione prova scritta B- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA SCRITTA C

(allegata prova scritta C + griglia correzione prova scritta C- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

La prova estratta dai candidati dott. De Rosa Raffaele e dott. Sambucci Elia è la prova scritta - questionario "C". L'elaborato estratto viene fatto firmare da entrambi i candidati che hanno estratto le prove, avendo cura che gli stessi non possano prendere visione delle domande ivi riportate.

Vengono aperte anche le buste "A" e "B" contenenti le prove non estratte (anch'esse sottoscritte dai candidati dott. De Rosa Raffaele e dott. Sambucci Elia).

PROVA PRATICA

La commissione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 220/2001 e del bando del concorso pubblico, stabilisce che la prova pratica consisterà *"nella esecuzione di tecniche specifiche, nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta o soluzione di quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla vertenti su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso"*.

Vengono predisposte all'unanimità le seguenti tre prove pratiche tra cui verrà estratta quella che costituirà l'oggetto dell'esame uguale per tutti i candidati.

Ogni **test è composto da 20 domande** e ciascuna domanda è corredata da 4 possibili risposte.

Tenuto conto che il punteggio per la valutazione della prova pratica, come previsto dal, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, è in ventesimi e che per il conseguimento dell'idoneità il **punteggio** minimo è di 14 punti su 20, la commissione stabilisce di valutare le prove con il seguente criterio:

la soglia minima per il raggiungimento dell'idoneità sarà di 14 risposte esatte pari a 14 punti; ad ogni ulteriore risposta corretta verrà attribuito 1 punto fino a raggiungere il massimo di 20, secondo lo schema sottostante:

Risposte esatte	Punteggio su 20
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

I quesiti senza risposta e le risposte errate non comportano detrazione di punteggio, il loro valore quindi è zero;

I tre test, tra cui verrà estratto quello che costituirà l'oggetto d'esame uguale per tutti i candidati, sono i seguenti:

PROVA PRATICA A

(allegata prova pratica A + griglia correzione prova pratica A - le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA PRATICA B

(allegata prova pratica B + griglia correzione prova pratica B- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

PROVA PRATICA C

(allegata prova pratica C + griglia correzione prova pratica C- le risposte corrette sono quelle evidenziate)

La prova estratta dai candidati dott. Guzzo Gianmarco Maria e dott. Corrado Angelo è la prova pratica - questionario "B". L'elaborato estratto viene fatto firmare da entrambi i candidati che hanno estratto le prove, avendo cura che gli stessi non possano prendere visione delle domande ivi riportate.

Vengono aperte anche le buste "A" e "C" contenenti le prove non estratte (anch'esse sottoscritte dai candidati dott. Guzzo Gianmarco Maria e dott. Corrado Angelo).

PROVA ORALE

La commissione, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, stabilisce che la prova orale verterà "su argomento scelto dalla Commissione attinente al profilo professionale messo a concorso oltre che sulla verifica degli elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese".

Vengono predisposte dalla commissione, all'unanimità, 13 possibili prove (3 per il giorno 29/10, 5 per il giorno 2/11 e 5 per il giorno 5/11) per permettere l'estrazione tra tre prove per ciascun turno previsto di colloqui ovvero 29 ottobre 2021 ore 8.30, 2 novembre 2021 ore 8.00, 11.00 e 14.30 e 5 novembre 2021 ore 8.00, 11.00 e 14.30, tutte di medesima difficoltà - ciascuna costituita da un

quesito con l'aggiunta di una domanda per verificare la conoscenza informatica e una domanda per la conoscenza della lingua inglese – tra cui verrà estratta quella che costituirà l'oggetto dell'esame uguale per tutti i candidati.

Per ciascuna giornata in cui sono previsti più turni (02/11 e 05/11) verranno predisposte n. 5 prove in totale: ad ogni turno previsto (8.00/11.00/14.30) verranno proposte 3 prove tra cui sorteggiare la prova che sarà oggetto di esame.

Al primo turno verrà sorteggiata una prova e, pertanto, per il secondo gruppo alle due prove rimaste ne verrà aggiunta una terza e così via.

Prima di procedere con l'effettuazione dei colloqui d'esame, la commissione, all'unanimità, ha stabilito che, per il conseguimento del voto minimo di sufficienza, nella risposta si debbano rilevare:

- capacità di inquadramento generale delle argomentazioni sottese;
- linearità dell'esposizione;
- capacità di sintetizzare le tematiche trattate senza che però vengano omessi gli aspetti più importanti della risposta;
- feedback positivo ad eventuali richieste di chiarimento della commissione esaminatrice.

La graduazione delle votazioni di sufficienza, dal minimo di 14 al massimo di 20, sarà stabilita tenendo conto del grado di completezza, approfondimento e della chiarezza espositiva.

PROVE ORALI DEL GIORNO 29/10/2021

- **prova orale a):**

PROVA A - allegato agli atti

- **prova orale b):**

PROVA B - allegato agli atti

- **prova orale c):**

PROVA C - allegato agli atti

La prova orale estratta, a cura della candidata dott.ssa Bizzocchi Eleonora è la prova A.

PROVE ORALI DEL GIORNO 02/11/2021

- **prova orale a):**

PROVA A - allegato agli atti

- **prova orale b):**

PROVA B - allegato agli atti

- **prova orale c):**

PROVA C - allegato agli atti

- **prova orale d):**

PROVA D - allegato agli atti

- **prova orale e):**

PROVA E- allegato agli atti

Per i candidati convocati alle ore 8.00 la prova orale estratta, a cura della candidata dott.ssa D'Antini Deborah è la prova C.

Per i candidati convocati alle ore 11.00 la prova orale estratta, a cura del candidato dott. De Rosa Raffaele è la prova B.

Per i candidati convocati alle ore 14.30 la prova orale estratta, a cura della candidata dott.ssa Masin Alice è la prova D.

PROVE ORALI DEL GIORNO 05/11/2021

- **prova orale a):**

PROVA A - allegato agli atti

- **prova orale b):**

PROVA B - allegato agli atti

- **prova orale c):**

PROVA C - allegato agli atti

- **prova orale d):**

PROVA D - allegato agli atti

- **prova orale e):**

PROVA E- allegato agli atti


Per i candidati convocati alle ore 8.00 la prova orale estratta, a cura del candidato dott. Pisano Claudio è la prova A.

Per i candidati convocati alle ore 11.00 la prova orale estratta, a cura del candidato dott. Sambucci Elia è la prova D.

Per i candidati convocati alle ore 14.30 la prova orale estratta, a cura della candidata dott.ssa Mazzei Serena è la prova B.


Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


Dott. Gianfranco Galli

I COMPONENTI:

dott.ssa Francesca Marrone




dott.ssa Giuliana Pieraccini



IL SEGRETARIO

dott.ssa Martina Santambrogio



8/10/2021

ASST Nord Milano - Protocollo 28929 del 05/11/2021 -

8/10/21 - SANGUINI ECA

PROVA NON

ESTRATTA

PROVA A

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

F. U. S. S. S.

PROVA NON ESTRATTA

1. Il termine "bradicinesia" indica esattamente:

- a) assenza di appetito
- b) tremore durante il sonno
- c) Mancanza di Potassio
- d) Nessuna delle risposte è corretta

2. Il piano di assistenza infermieristica è?

- a) dinamico
- b) teorico
- c) statico
- d) aleatorio

3. Quale scala di valutazione viene usata per la classificazione delle piaghe da decubito?

- a) Braden e Norton
- b) VAS
- c) Glaslow
- d) Bina

4. La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali / superfici precedentemente detersi è il processo di:

- a) decontaminazione
- b) disinfezione
- c) detersione
- d) sterilizzazione



5. Quando i guanti possono essere utilizzati al posto dell'igiene delle mani ?

- a) sempre prima del contatto con il paziente
- b) mai, i guanti non sostituiscono l'igiene delle mani
- c) solo prima di una manovra asettica
- d) quando le mani sono visibilmente sporche

6. Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:

- a) ferita profonda a spessore parziale che interessa il muscolo
- b) iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione
- c) ferita profonda a spessore parziale che interessa il tessuto connettivo
- d) ferita a spessore parziale che interessa il tessuto connettivo

7. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a) indumenti e/o presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b) contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c) indumenti e/o presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni
- d) misure immediate che devono essere attuate in caso di esposizione professionale a materiale biologico attraverso punture, tagli o contaminazione su cute lesa o mucose

8. Il plasma è:

- a) la parte corpuscolata del sangue
- b) la parte liquida del sangue
- c) un tessuto connettivo
- d) sinonimo di linfa



9. Quali dei seguenti segni possono manifestarsi in un paziente in terapia con anticoagulanti per via orale?

- a) difficoltà alla deglutizione e odinofagia
- b) riniti, crisi asmatiche
- c) sanguinamento gengivale, ematuria, epistassi
- d) nevralgie, parestesie

10. Per "ASEPSI" si intende:

- a) un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- b) un insieme di norme atte ad impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni
- c) un processo che permette l'eliminazione dei solo batteri
- d) la detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente

11. La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Core) è:

- a) una scala di accertamento del dolore
- b) uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area pediatrica
- c) una scala che , durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata
- d) uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica

12. La norma che ha sancito l'abolizione del "mansionario" è:

- a) D.M. 14 settembre 1994, n. 739
- b) Legge 26 febbraio 1999, n. 42
- c) D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225
- d) Legge 10 agosto 2000, n. 251





13. Quale, tra quelle elencate, non rientra tra le tipologie di attività formative che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi per l'infermiere?

- a) formazione a distanza (FAD)
- b) partecipazione a convegni o congressi
- c) partecipazione a viaggi studio all'estero
- d) attività di docenza o tutoring

14. L'afasia è:

- a) un'alterazione respiratoria
- b) un'alterazione motoria
- c) un'alterazione del linguaggio
- d) un'alterazione della sfera affettiva

15. Funzionalmente l'emoglobina può essere definita una proteina:

- a) di riserva
- b) di trasporto
- c) di difesa
- d) di struttura

16. I diverticoli esofagei sono:

- a) restringimenti del lume esofageo
- b) strozzamenti dell'esofago
- c) estroflessioni della parete esofagea
- d) estroflessioni del cardias





17. La sincope causata da sforzi estremi o paura è classificata come:

- a) sincope da ipotensione ortostatica
- b) sincope del seno carotideo
- c) sincope vasovagale
- d) sincope cardiaca

18. Nell'occlusione intestinale l'alvo è:

- a) chiuso a gas e feci
- b) aperto ai gas
- c) aperto a gas e feci
- d) regolare

19. L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:

- a) da un'elevata presenza di batteri
- b) dalla presenza di pigmenti biliari
- c) da disfunzionalità cardiocircolatorie
- d) dalla presenza di sangue

20. La clorexidina è un disinfettante che agisce:

- a) sui batteri gram-negativi
- b) sui miceti
- c) sui batteri
- d) sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi





21. Quale tra le seguenti azioni non è propria dell'acido acetilsalicilico?

- a) l'azione antipiretica
- b) l'azione uricosurica
- c) l'azione antiemetica
- d) l'azione antiaggregante piastrinica

22. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica:

- a) sindrome nefrosica
- b) diabete mellito
- c) gastroenterite
- d) pancreatite

23. Con il termine "pollachiuria" si intende:

- a) l'elevata frequenza delle minzioni
- b) l'eccessiva quantità di urina prodotta
- c) la perdita involontaria di urina
- d) un'infezione delle vie urinarie

24. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura:

- a) tecnica, relazionale ed educativa
- b) esclusivamente tecnica
- c) esclusivamente relazionale
- d) tecnica ma non educativa





25. Nel prelievo per emocoltura:

- a) ogni flacone contiene anticoagulante
- b) ogni flacone contiene del terreno di coltura
- c) i flaconi contengono acido citrico
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta

26. Il ferro per via orale va assunto:

- a) a stomaco pieno
- b) con succhi di frutta
- c) con molta acqua
- d) come preferisce il paziente

27. Qual è lo scopo principale della rianimazione cardiopolmonare ?

- a) pervietà delle vie aeree
- b) sostegno cardiocircolatorio di base
- c) prevenire il danno anossico cerebrale
- d) ventilazione con pallone Ambu

28. Lo scopo della prevenzione secondaria è:

- a) la diagnosi precoce
- b) l'educazione sanitaria
- c) la riabilitazione
- d) la vaccinazione di massa



29. Il calo fisiologico del neonato è dovuto a :

- a) scarsa alimentazione nei primi giorni di vita
- b) emissione di meconio
- c) emissione di urina
- d) tutte le precedenti alternative sono corrette

30. Quale tra le seguenti è una funzione propria della placenta?

- a) funzione nutritiva
- b) funzione endocrina
- c) funzione protettiva(di barriera)
- d) tutte le precedenti alternative sono corrette



PROVA A

1. Il termine "bradicinesia" indica esattamente:

- a) assenza di appetito
- b) tremore durante il sonno
- c) Mancanza di Potassio

d) Nessuna delle risposte è corretta

2. Il piano di assistenza infermieristica è?

a) dinamico

- b) teorico
- c) statico
- d) aleatorio

3. Quale scala di valutazione viene usata per la classificazione delle piaghe da decubito?

a) Braden e Norton

- b) VAS
- c) Glaslow
- d) Bina

4. La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali / superfici precedentemente detersi è il processo di:

- a) decontaminazione
- b) disinfezione**
- c) detersione
- d) sterilizzazione

5. Quando i guanti possono essere utilizzati al posto dell'igiene delle mani ?

- a) sempre prima del contatto con il paziente
- b) mai, i guanti non sostituiscono l'igiene delle mani**
- c) solo prima di una manovra asettica
- d) quando le mani sono visibilmente sporche

6. Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:

- a) ferita profonda a spessore parziale che interessa il muscolo
- b) iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione**
- c) ferita profonda a spessore parziale che interessa il tessuto connettivo
- d) ferita a spessore parziale che interessa il tessuto connettivo

7. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a) indumenti e/o presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b) contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c) indumenti e/o presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni**
- d) misure immediate che devono essere attuate in caso di esposizione professionale a materiale biologico attraverso punture, tagli o contaminazione su cute lesa o mucose

8. Il plasma è:

- a) la parte corpuscolata del sangue
- b) la parte liquida del sangue**
- c) un tessuto connettivo
- d) sinonimo di linfa

9. Quali dei seguenti segni possono manifestarsi in un paziente in terapia con anticoagulanti per via orale?

- a) difficoltà alla deglutizione e odinofagia
- b) riniti, crisi asmatiche
- c) sanguinamento gengivale, ematuria, epistassi**
- d) nevralgie, parestesie

10. Per “ASEPSI” si intende:

- a) un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- b) un insieme di norme atte ad impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni**
- c) un processo che permette l’eliminazione dei solo batteri
- d) la detersione eseguita mediante l’uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente

11. La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Core) è:

- a) una scala di accertamento del dolore
- b) uno strumento per documentare l’assistenza infermieristica in area pediatrica
- c) una scala che , durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata**
- d) uno strumento per documentare l’assistenza infermieristica in area critica

12. La norma che ha sancito l’abolizione del “mansionario” è:

- a) D.M. 14 settembre 1994, n. 739
- b) Legge 26 febbraio 1999, n. 42**
- c) D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225
- d) Legge 10 agosto 2000, n. 251

13. Quale, tra quelle elencate, non rientra tra le tipologie di attività formative che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi per l'infermiere?

- a) formazione a distanza (FAD)
- b) partecipazione a convegni o congressi
- c) partecipazione a viaggi studio all'estero**
- d) attività di docenza o tutoring

14. L'afasia è:

- a) un'alterazione respiratoria
- b) un'alterazione motoria
- c) un'alterazione del linguaggio**
- d) un'alterazione della sfera affettiva

15. Funzionalmente l'emoglobina può essere definita una proteina:

- a) di riserva
- b) di trasporto**
- c) di difesa
- d) di struttura

16. I diverticoli esofagei sono:

- a) restringimenti del lume esofageo
- b) strozzamenti dell'esofago
- c) estroflessioni della parete esofagea**
- d) estroflessioni del cardias

17. La sincope causata da sforzi estremi o paura è classificata come:

- a) sincope da ipotensione ortostatica
- b) sincope del seno carotideo
- c) sincope vasovagale**
- d) sincope cardiaca

18. Nell'occlusione intestinale l'alvo è:

- a) chiuso a gas e feci**
- b) aperto ai gas
- c) aperto a gas e feci
- d) regolare

19. L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:

- a) da un'elevata presenza di batteri
- b) dalla presenza di pigmenti biliari**
- c) da disfunzionalità cardiocircolatorie
- d) dalla presenza di sangue

20. La clorexidina è un disinfettante che agisce:

- a) sui batteri gram-negativi
- b) sui miceti
- c) sui batteri
- d) sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi**

21. Quale tra le seguenti azioni non è propria dell'acido acetilsalicilico?

- a) l'azione antipiretica
- b) l'azione uricosurica
- c) l'azione antiemetica**
- d) l'azione antiaggregante piastrinica

22. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica:

- a) sindrome nefrosica
- b) diabete mellito
- c) gastroenterite**
- d) pancreatite

23. Con il termine "pollachiuria" si intende:

- a) l'elevata frequenza delle minzioni**
- b) l'eccessiva quantità di urina prodotta
- c) la perdita involontaria di urina
- d) un'infezione delle vie urinarie

24. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura:

- a) tecnica, relazionale ed educativa**
- b) esclusivamente tecnica
- c) esclusivamente relazionale
- d) tecnica ma non educativa

25. Nel prelievo per emocoltura:

- a) ogni flacone contiene anticoagulante
- b) ogni flacone contiene del terreno di coltura**
- c) i flaconi contengono acido citrico
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta

26. Il ferro per via orale va assunto:

- a) a stomaco pieno**
- b) con succhi di frutta
- c) con molta acqua
- d) come preferisce il paziente

27. Qual è lo scopo principale della rianimazione cardiopolmonare ?

- a) pervietà delle vie aeree
- b) sostegno cardiocircolatorio di base
- c) prevenire il danno anossico cerebrale**
- d) ventilazione con pallone Ambu

28. Lo scopo della prevenzione secondaria è:

- a) la diagnosi precoce**
- b) l'educazione sanitaria
- c) la riabilitazione
- d) la vaccinazione di massa

29. Il calo fisiologico del neonato è dovuto a :

- a) scarsa alimentazione nei primi giorni di vita
- b) emissione di meconio
- c) emissione di urina

d) tutte le precedenti alternative sono corrette

30. Quale tra le seguenti è una funzione propria della placenta?

- a) funzione nutritiva
- b) funzione endocrina
- c) funzione protettiva(di barriera)

d) tutte le precedenti alternative sono corrette

PROVA NON ESTIMATA

8/10/2021 SAMBUCA' EA'A

Fug Sella

PROVA B

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ASST Nord Milano

PROVA NON ESTIMATA

8/10/2021

F. P. Sella

1. Per policitemia si intende un aumento:

- a) della concentrazione degli eritrociti
- b) delle immunoglobuline
- c) del potassio
- d) del volume plasmatico

2. Il processo di assistenza infermieristica è:

- a) un azione
- b) un metodo
- c) una valutazione
- d) un postulato

3. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

- a) la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- b) la valutazione del rischio di caduta
- c) la valutazione del rischio di malnutrizione
- d) la valutazione dello stato di coscienza

4. La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:

- a) caduta della lingua all'indietro
- b) flessione della lingua
- c) broncospasmo
- d) collasso da trachea





5. L'incapacità di eseguire movimenti volontari in assenza di paralisi è chiamata:

- a) atassia
- b) agonia
- c) astenia
- d) artrosi

6. Un paziente con insufficienza respiratoria va incontro a:

- a) incontinenza
- b) acidosi
- c) compromissione del circolo cardiaco
- d) ipertensione

7. Quale posizione deve essere fatta assumere ad un paziente con edema polmonare acuto?

- a) seduto con gli arti inferiori sollevati
- b) seduto con gli arti inferiori fuori dal letto (Ortopnoica)
- c) in piedi con le mani alzate sopra la testa
- d) Fowler alta

8. Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi tranne uno: quale?

- a) tremore
- b) scialorrea
- c) ipertonia
- d) ipostenia



9. In quale delle seguenti condizioni è indicata la manovra di Heimlich?

- a) inalazione di corpo estraneo
- b) insufficienza respiratoria
- c) caduta posteriore della lingua
- d) pneumotorace

10. La disinfezione è:

- a) un insieme di tecniche volte alla distruzione degli agenti patogeni
- b) una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi
- c) una pulizia mediante sostanze liquide che eliminano qualunque residuo organico
- d) un allontanamento dei germi patogeni dall'ambiente ospedaliero

11. L'attuale Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- a) dalla Federazione Nazionale dell'Ordine Professioni Infermieristiche
- b) per decreto dal Ministero della Sanità
- c) per decreto legislativo dal Governo
- d) all'interno del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

12. La rachicentesi si effettua per:

- a) prelevare campioni di liquor
- b) misurare la pressione liquorale
- c) somministrare farmaci attraverso il canale midollare
- d) tutte le alternative precedenti sono corrette



13. La documentazione infermieristica :

- a) ha valore di certificato in quanto redatta da un pubblico ufficiale
- b) ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
- c) ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
- d) non ha alcun valore giuridico

14. Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:


- a) nella rete fognaria
- b) in contenitore per la raccolta di materiale biologico
- c) in contenitori di cartone rigido impermeabili
- d) in contenitori di propilene rigido imperforabili e impermeabili

15. Le vertebre cervicali sono:

- a) 3
- b) 7
- c) 10
- d) 5

16. Cosa è l'essudato?

- a) liquido infiammatorio di provenienza plasmatica
- b) pus
- c) liquido che ha origine idrodinamica
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

17. La formazione universitaria per la professione infermieristica è stata introdotta:

- a) con il D.Lgs n.502 del 1992
- b) con la legge n.795 del 1973
- c) con il D.M. n.509 del 1999
- d) con la legge n.42 del 1999

18. L'incontinenza urinaria si definisce come:


- a) l'incapacità da parte della vescica di contenere più di 300 cc di urina
- b) l'impossibilità da parte di un soggetto di urinare quando la vescica non è completamente
- c) l'emissione involontaria di urina
- d) la capacità di rinviare a piacimento l'atto minzionale

19. Il catetere di SWAN-GANZ raggiunge:

- a) l'arteria polmonare
- b) la vena cava
- c) l'aorta discendente
- d) la vena cava inferiore

20. Una riduzione del valore di ematocrito è indice di:

- a) policitemia
- b) anemia
- c) neoplasia
- d) nessuna delle alternative precedenti è corretta





21. L'utilizzo dei guanti è una misura:

- a) alternativa al lavaggio sociale delle mani
- b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
- c) alternativa al lavaggio antisettico delle mani
- d) aggiuntiva al lavaggio delle mani

22. Il PAP –TEST è un test screening per tumori:

- a) dell'uretra
- b) dell'intestino tenue
- c) della cervice uterina
- d) della mammella

23. La definizione di emottisi è:

- a) emissioni di sangue con le feci
- b) emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- c) emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie
- d) emissione di sangue con il vomito

24. Negli studi "in cieco" :

- a) la selezione del campione è probabilistica
- b) sia il paziente, sia il ricercatore non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento
- c) solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento
- d) l'identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

25. Le infezioni crociate ospedaliere rappresentano lo scambio di infezioni tra:

- a) sano e sano in ambiente ospedaliero
- b) sani e visitatori
- c) malati portatori sani e personale di assistenza recettivo
- d) visitatori e personale di assistenza recettivo

26. L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è:

- a) la fibrillazione ventricolare
- b) l'asistolia
- c) la dissociazione elettromeccanica
- d) la fibrillazione atriale

27. Il Cardias è:

- a) uno sfintere del retto
- b) uno sfintere del duodeno
- c) uno sfintere dello stomaco
- d) una valvola del cuore

28. Secondo il profilo professionale, l'assistenza infermieristica è:

- a) preventiva, curativa, palliativa ,riabilitativa
- b) preventiva, curativa, educativa , riabilitativa
- c) preventiva, curativa, educativa, sostitutiva
- d) preventiva ,curativa, riabilitativa e di area critica



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

29. L'entità di un' emorragia digestiva si valuta mediante la diminuzione del valore ematico di:

- a) emazie
- b) piastrine
- c) ematocrito
- d) emoglobina

30. La carotide è:

- a) un' arteria che porta sangue alla testa
- b) una vena che porta sangue all'encefalo
- c) un'arteria che porta sangue ai polmoni
- d) un'arteria che porta sangue al cuore

PROVA B

1. Per policitemia si intende un aumento:

- a) della concentrazione degli eritrociti**
- b) delle immunoglobuline
- c) del potassio
- d) del volume plasmatico

2. Il processo di assistenza infermieristica è:

- a) un azione
- b) un metodo**
- c) una valutazione
- d) un postulato

3. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

- a) la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- b) la valutazione del rischio di caduta**
- c) la valutazione del rischio di malnutrizione
- d) la valutazione dello stato di coscienza

4. La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:

- a) caduta della lingua all'indietro**
- b) flessione della lingua
- c) broncospasmo
- d) collasso da trachea

5. L'incapacità di eseguire movimenti volontari in assenza di paralisi è chiamata:

- a) **atassia**
- b) agonia
- c) astenia
- d) artrosi

6. Un paziente con insufficienza respiratoria va incontro a:

- a) incontinenza
- b) **acidosi**
- c) compromissione del circolo cardiaco
- d) ipertensione

7. Quale posizione deve essere fatta assumere ad un paziente con edema polmonare acuto?

- a) seduto con gli arti inferiori sollevati
- b) **seduto con gli arti inferiori fuori dal letto (Ortopnoica)**
- c) in piedi con le mani alzate sopra la testa
- d) Fowler alta

8. Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi tranne uno: quale?

- a) tremore
- b) scialorrea
- c) ipertonia
- d) **ipostenia**

9. In quale delle seguenti condizioni è indicata la manovra di Heimlich?

- a) inalazione di corpo estraneo
- b) insufficienza respiratoria
- c) caduta posteriore della lingua
- d) pneumotorace

10. La disinfezione è:

- a) un insieme di tecniche volte alla distruzione degli agenti patogeni
- b) una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi
- c) una pulizia mediante sostanze liquide che eliminano qualunque residuo organico
- d) un allontanamento dei germi patogeni dall'ambiente ospedaliero

11. L'attuale Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:

- a) dalla Federazione Nazionale dell'Ordine Professioni Infermieristiche
- b) per decreto dal Ministero della Sanità
- c) per decreto legislativo dal Governo
- d) all'interno del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

12. La rachicentesi si effettua per:

- a) prelevare campioni di liquor
- b) misurare la pressione liquorale
- c) somministrare farmaci attraverso il canale midollare
- d) tutte le alternative precedenti sono corrette



13. La documentazione infermieristica :

- a) ha valore di certificato in quanto redatta da un pubblico ufficiale
- b) ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
- c) ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio**
- d) non ha alcun valore giuridico

14. Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:

- a) nella rete fognaria
- b) in contenitore per la raccolta di materiale biologico
- c) in contenitori di cartone rigido impermeabili
- d) in contenitori di propilene rigido imperforabili e impermeabili**

15. Le vertebre cervicali sono:

- a) 3
- b) 7**
- c) 10
- d) 5

16. Cosa è l'essudato?

- a) liquido infiammatorio di provenienza plasmatica**
- b) pus
- c) liquido che ha origine idrodinamica
- d) nessuna delle precedenti alternative è corretta

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

17. La formazione universitaria per la professione infermieristica è stata introdotta:

- a) **con il D.Lgs n.502 del 1992**
- b) con la legge n.795 del 1973
- c) con il D.M. n.509 del 1999
- d) con la legge n.42 del 1999

18. L'incontinenza urinaria si definisce come:

- a) l'incapacità da parte della vescica di contenere più di 300 cc di urina
- b) l'impossibilità da parte di un soggetto di urinare quando la vescica non è completamente
- c) **l'emissione involontaria di urina**
- d) la capacità di rinviare a piacimento l'atto minzionale

19. Il catetere di SWAN-GANZ raggiunge:

- a) **l'arteria polmonare**
- b) la vena cava
- c) l'aorta discendente
- d) la vena cava inferiore

20. Una riduzione del valore di ematocrito è indice di:

- a) policitemia
- b) **anemia**
- c) neoplasia
- d) nessuna delle alternative precedenti è corretta

21. L'utilizzo dei guanti è una misura:

- a) alternativa al lavaggio sociale delle mani
- b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
- c) alternativa al lavaggio antisettico delle mani
- d) aggiuntiva al lavaggio delle mani**

22. Il PAP –TEST è un test screening per tumori:

- a) dell'uretra
- b) dell'intestino tenue
- c) della cervice uterina**
- d) della mammella

23. La definizione di emottisi è:

- a) emissioni di sangue con le feci
- b) emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- c) emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie**
- d) emissione di sangue con il vomito

24. Negli studi "in cieco" :

- a) la selezione del campione è probabilistica
- b) sia il paziente, sia il ricercatore non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento
- c) solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento**
- d) l'identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

25. Le infezioni crociate ospedaliere rappresentano lo scambio di infezioni tra:

- a) sano e sano in ambiente ospedaliero
- b) sani e visitatori
- c) malati portatori sani e personale di assistenza recettivo**
- d) visitatori e personale di assistenza recettivo

26. L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è:

- a) la fibrillazione ventricolare**
- b) l'asistolia
- c) la dissociazione elettromeccanica
- d) la fibrillazione atriale

27. Il Cardias è:

- a) uno sfintere del retto
- b) uno sfintere del duodeno
- c) uno sfintere dello stomaco**
- d) una valvola del cuore

28. Secondo il profilo professionale, l'assistenza infermieristica è:

- a) preventiva, curativa, palliativa ,riabilitativa**
- b) preventiva, curativa, educativa , riabilitativa
- c) preventiva, curativa, educativa, sostitutiva
- d) preventiva ,curativa, riabilitativa e di area critica

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

29. L'entità di un' emorragia digestiva si valuta mediante la diminuzione del valore ematico di:

- a) emazie
- b) piastrine
- c) ematocrito
- d) **emoglobina**

30. La carotide è:

- a) **un' arteria che porta sangue alla testa**
- b) una vena che porta sangue all'encefalo
- c) un'arteria che porta sangue ai polmoni
- d) un'arteria che porta sangue al cuore

PROVA ESTRATTA

PROVA ESTRATTA

8/10/21

8/10/21

Frey
PROVA C



de Ros

1. La disuria è una minzione:

- a) Che avviene senza stimolo di urinare
- b) Frequente di poche gocce di urina
- c) dolorosa
- d) notturna

2. Quale è il significato del termine leucocitosi?

- a) Eccesso di globuli bianchi
- b) Carenza di globuli rossi
- c) Carenza di piastrine
- d) Carenza di globuli bianchi

3. Dopo una trasfusione di sangue INCOMPATIBILE il paziente presenta :

- a) reazione emolitica
- b) complicanze infettive
- c) disidratazione
- d) riduzione delle proteine plasmatiche

4. Quale tra i seguenti è un vettore di trasmissione di malattie infettive?

- a) aria
- b) acqua
- c) zanzara
- d) alimenti



5. Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:

- a) AB Rh negativo
- b) A Rh positivo
- c) 0 Rh negativo
- d) 0 Rh positivo

6. La prevenzione primaria consiste:

- a) nel rimuovere i fattori di rischio
- b) nell'applicazione di un test di screening
- c) nella diagnosi precoce di una malattia
- d) nel supporto terapeutico e psichico del paziente

7. Nella diagnosi di sindrome del tunnel carpale l'indagine diagnostica più utile è:

- a) L'ECG
- b) la TAC
- c) l'elettromiografia
- d) l'esame radiografico

8. La bile è prodotta da:

- a) cistifellea
- b) pancreas
- c) fegato
- d) duodeno



9. Il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere è regolamentato dai contenuti del:

- a) profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post- base
- b) codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post-base , L 341/1990
- c) profilo professionale, ordinamento didattico di base e formazione post-base, D.M.509/1999
- d) profilo professionale, codice deontologico e L.251/2000

10. La malattia emolitica neonatale si manifesta nelle seguenti condizioni:

- a) madre Rh positivo e padre Rh positivo
- b) madre Rh positivo e feto Rh negativo
- c) madre Rh negativo e feto Rh positivo
- d) madre Rh positivo, padre Rh negativo e feto Rh negativo

11. Quando si indossano i guanti, le mani devono essere lavate:

- a) solo prima di indossarli
- b) prima e dopo averli indossati
- c) solo quando evidentemente contaminate
- d) solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

12. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:

- a) dopo aver effettuato l'igiene personale
- b) tutte le volte che sente le gambe appesantite
- c) prima di alzarsi dal letto al mattino
- d) dopo aver camminato



13. Gli esami di laboratorio più significativi per la diagnosi di pancreatite sono:

- a) amilasi e lipasi
- b) emocromo completo
- c) elettroliti sierici e urinari
- d) bilirubina

14. L'ematemesi indica :

- a) un episodio di vomito con presenza di sangue
- b) la presenza di sangue occulto nelle feci
- c) l'emorragia rettale massiva
- d) la rottura dei capillari delle cavità nasali

15. La principale via di escrezione dei farmaci è quella:

- a) biliare
- b) renale
- c) orale
- d) cutanea, mediante sudorazione

16. Durante lo stadio di latenza di una malattia:

- a) la malattia è presente ma è ancora asintomatica
- b) la malattia è sintomatica ma non è ancora stata diagnosticata
- c) il paziente si trova allo stadio terminale della malattia
- d) è massima la possibilità di contagiare altre persone



17. IL PH del succo gastrico è compreso tra:

- a) 7 e 8
- b) 1 e 2
- c) 5 e 6
- d) 4 e 5

18. Quale scala di valutazione viene usata per la classificazione delle piaghe da decubito?

- a) Braden e Norton
- b) VAS
- c) Glaslow
- d) Bina

19. Il termine triage indica una procedura finalizzata a:

- a) dare soccorso al maggior numero di persone possibile contemporaneamente
- b) ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione
- c) valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo
- d) l'assegnazione dei pazienti nei reparti

20. Si provvede alla pulizia della cannula tracheostomica al fine di:

- a) mantenere pervie le vie aeree e prevenire le infezioni
- b) introdurre alimenti liquidi e mantenere pervie le vie aeree
- c) prevenire le infezioni e permettere l'alimentazione per OS
- d) mantenere pervie le vie aeree e garantire la funzione fonatoria della laringe



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

21. La legge n. 251 del 10 agosto 2000, ha introdotto una importante novità nella disciplina della professione sanitaria infermieristica. Essa infatti :

- a) istituisce per la professione infermieristica la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario
- b) definisce ulteriori norme del Codice Deontologico
- c) posticipa l'età pensionabile
- d) stabilisce nuovi criteri di selezione per l'accesso alla professione

22. Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:

- a) problemi, educazione
- b) problemi, obiettivi, riabilitazione
- c) problemi ,obiettivi, interventi, valutazione
- d) problemi, diagnosi, obiettivi, riabilitazione

23. La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:

- a) il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
- b) il rischio di insorgenza di una lesione da pressione
- c) lo stato di salute di un neonato alla nascita
- d) la valutazione dello stato di coscienza

24. L'SPDC è un:

- a) servizio di prevenzione e di diagnosi e cura
- b) servizio di prevenzione e di dimissione concertate
- c) servizio psichiatrico e di diagnosi e cura
- d) servizio di profilassi domiciliare curativo



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

25. Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

- a) è il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte
- b) è il conferimento di attività al personale medico
- c) prevede l'affidamento di un compito di self care a un paziente
- d) prevede l'affidamento di un compito generico a più soggetti

26. In un neonato a basso peso è necessario:

- a) un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
- b) un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo
- c) un'alimentazione latte per evitare l'ipoglicemia
- d) un'infusione endovenosa continua per evitare la disidratazione

27. La deontologia professionale :

- a) è l'insieme di regole che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale determinato (professione sanitaria)
- b) si propone di guidare la coscienza del professionista verso il bene morale
- c) è un sinonimo di "etica"
- d) non è vincolante per il professionista sanitario

28. Con il termine antisepsi si intende la:

- a) distruzione di microorganismi patogeni e saprofiti presenti in un materiale o in un ambiente
- b) distruzione dei microorganismi patogeni presenti in un materiale o in un ambiente
- c) pratica che blocca le attività metaboliche dei microrganismi
- d) distruzione dei parassiti



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Nord Milano

29. Le ulcere sono:

- a) perdite di sostanza che tendono alla guarigione spontanea
- b) delle piaghe
- c) sia piaghe che perdite di sostanze che tendono alla guarigione spontanea
- d) perdite di sostanza che non tendono alla guarigione spontanea

30. Per cardiopatia ischemica si intende:

- a) necrosi del miocardio
- b) malattia primitiva del miocardio
- c) apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco
- d) apporto insufficiente alla valvola tricuspide



PROVA C

1. La disuria è una minzione:

- a) Che avviene senza stimolo di urinare
- b) Frequente di poche gocce di urina
- c) dolorosa
- d) notturna

2. Quale è il significato del termine leucocitosi?

- a) Eccesso di globuli bianchi
- b) Carenza di globuli rossi
- c) Carenza di piastrine
- d) Carenza di globuli bianchi

3. Dopo una trasfusione di sangue INCOMPATIBILE il paziente presenta :

- a) reazione emolitica
- b) complicanze infettive
- c) disidratazione
- d) riduzione delle proteine plasmatiche

4. Quale tra i seguenti è un vettore di trasmissione di malattie infettive?

- a) aria
- b) acqua
- c) zanzara
- d) alimenti

5. Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:

- a) AB Rh negativo
- b) A Rh positivo
- c) 0 Rh negativo
- d) 0 Rh positivo

6. La prevenzione primaria consiste:

- a) nel rimuovere i fattori di rischio
- b) nell'applicazione di un test di screening
- c) nella diagnosi precoce di una malattia
- d) nel supporto terapeutico e psichico del paziente

7. Nella diagnosi di sindrome del tunnel carpale l'indagine diagnostica più utile è:

- a) L'ECG
- b) la TAC
- c) l'elettromiografia
- d) l'esame radiografico

8. La bile è prodotta da:

- a) cistifellea
- b) pancreas
- c) fegato
- d) duodeno

9. Il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere è regolamentato dai contenuti del:

- a) **profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post- base**
- b) codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post-base , L 341/1990
- c) profilo professionale, ordinamento didattico di base e formazione post-base, D.M.509/1999
- d) profilo professionale, codice deontologico e L.251/2000

10. La malattia emolitica neonatale si manifesta nelle seguenti condizioni:

- a) madre Rh positivo e padre Rh positivo
- b) madre Rh positivo e feto Rh negativo
- c) madre Rh negativo e feto Rh positivo**
- d) madre Rh positivo, padre Rh negativo e feto Rh negativo

11. Quando si indossano i guanti, le mani devono essere lavate:

- a) solo prima di indossarli
- b) prima e dopo averli indossati**
- c) solo quando evidentemente contaminate
- d) solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

12. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:

- a) dopo aver effettuato l'igiene personale
- b) tutte le volte che sente le gambe appesantite
- c) prima di alzarsi dal letto al mattino**
- d) dopo aver camminato

13. Gli esami di laboratorio più significativi per la diagnosi di pancreatite sono:

- a) amilasi e lipasi
- b) emocromo completo
- c) elettroliti sierici e urinari
- d) bilirubina

14. L'ematemesi indica :

- a) un episodio di vomito con presenza di sangue
- b) la presenza di sangue occulto nelle feci
- c) l'emorragia rettale massiva
- d) la rottura dei capillari delle cavità nasali

15. La principale via di escrezione dei farmaci è quella:

- a) biliare
- b) renale
- c) orale
- d) cutanea, mediante sudorazione

16. Durante lo stadio di latenza di una malattia:

- a) la malattia è presente ma è ancora asintomatica
- b) la malattia è sintomatica ma non è ancora stata diagnosticata
- c) il paziente si trova allo stadio terminale della malattia
- d) è massima la possibilità di contagiare altre persone

17. IL PH del succo gastrico è compreso tra:

- a) 7 e 8
- b) 1 e 2**
- c) 5 e 6
- d) 4 e 5

18. Quale scala di valutazione viene usata per la classificazione delle piaghe da decubito?

- a) Braden e Norton**
- b) VAS
- c) Glaslow
- d) Bina

19. Il termine triage indica una procedura finalizzata a:

- a) dare soccorso al maggior numero di persone possibile contemporaneamente
- b) ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione**
- c) valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo**
- d) l'assegnazione dei pazienti nei reparti

20. Si provvede alla pulizia della cannula tracheostomica al fine di:

- a) mantenere pervie le vie aeree e prevenire le infezioni**
- b) introdurre alimenti liquidi e mantenere pervie le vie aeree
- c) prevenire le infezioni e permettere l'alimentazione per OS
- d) mantenere pervie le vie aeree e garantire la funzione fonatoria della laringe



21. La legge n. 251 del 10 agosto 2000, ha introdotto una importante novità nella disciplina della professione sanitaria infermieristica. Essa infatti :

- a) **istituisce per la professione infermieristica la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario**
- b) definisce ulteriori norme del Codice Deontologico
- c) posticipa l'età pensionabile
- d) stabilisce nuovi criteri di selezione per l'accesso alla professione

22. Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:

- a) problemi, educazione
- b) problemi, obiettivi, riabilitazione
- c) problemi, obiettivi, interventi, valutazione**
- d) problemi, diagnosi, obiettivi, riabilitazione

23. La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:

- a) il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
- b) il rischio di insorgenza di una lesione da pressione
- c) lo stato di salute di un neonato alla nascita
- d) la valutazione dello stato di coscienza**

24. L'SPDC è un:

- a) servizio di prevenzione e di diagnosi e cura
- b) servizio di prevenzione e di dimissione concertate
- c) servizio psichiatrico e di diagnosi e cura**

d) servizio di profilassi domiciliare curativo

25. Nell'ambito infermieristico quali delle seguenti affermazioni è riferibile alla delega?

a) è il conferimento ad altri soggetti dello stesso ruolo di responsabilità di azioni già svolte

b) è il conferimento di attività al personale medico

c) prevede l'affidamento di un compito di self care a un paziente

d) prevede l'affidamento di un compito generico a più soggetti

26. In un neonato a basso peso è necessario:

a) un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia

b) un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo

c) un'alimentazione lattea per evitare l'ipoglicemia

d) un'infusione endovenosa continua per evitare la disidratazione

27. La deontologia professionale :

a) è l'insieme di regole che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale determinato (professione sanitaria)

b) si propone di guidare la coscienza del professionista verso il bene morale

c) è un sinonimo di "etica"

d) non è vincolante per il professionista sanitario

28. Con il termine antisepsi si intende la:

a) distruzione di microorganismi patogeni e saprofiti presenti in un materiale o in un ambiente

b) distruzione dei microorganismi patogeni presenti in un materiale o in un ambiente

c) pratica che blocca le attività metaboliche dei microrganismi

d) distruzione dei parassiti

29. Le ulcere sono:

a) perdite di sostanza che tendono alla guarigione spontanea

b) delle piaghe

c) sia piaghe che perdite di sostanze che tendono alla guarigione spontanea

d) perdite di sostanza che non tendono alla guarigione spontanea

30. Per cardiopatia ischemica si intende:

a) necrosi del miocardio

b) malattia primitiva del miocardio

c) apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco

d) apporto insufficiente alla valvola tricuspidale

*Angela Cella 8/10/2021
PROVA NEW BIMAT*

PROVA NOV ESIRANA

PROVA A (PRATICA)

1 Per aiutare un paziente con laparotomia addominale ad espettorare le secrezioni è maggiormente utile:

- a) fargli assumere la posizione laterale
- b) fargli assumere la posizione prona e invitarlo a tossire con decisione e a contenere la lesione
- c) invitarlo a tossire tenendo il capo flesso verso il basso
- d) associare la posizione semiseduta a respiri profondi e colpi di tosse invitandolo a contenersi la lesione

2 Se il monitor cardiaco va in allarme si deve:

- a) verificare i collegamenti e valutare clinicamente il paziente
- b) vedere il colorito cutaneo del paziente e rilevare il polso femorale
- c) togliere gli elettrodi
- d) spegnere gli allarmi

3 Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:

- a) controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni
- b) controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
- c) controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
- d) controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

4 La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:

- a) con garze non sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- b) con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- c) con garze sterili percorrendo la linea di sutura da sinistra a destra e viceversa per più volte
- d) con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari

5 L'infermiere sta assistendo un paziente positivo per epatite A. Cosa dovrebbe fare l'infermiere?

- a) indossare un camice monouso quando entra nella stanza del paziente
- b) prestare attenzione quando consegna gli alimenti al paziente
- c) utilizzare i guanti quando cambia la biancheria del letto del paziente
- d) indossare una mascherina

6 Il test di Allen va eseguito:

- a) prima del posizionamento di un catetere venoso centrale (CVC) nella vena succlavia
- b) dopo il posizionamento di un catetere vescicale
- c) dopo l'intubazione endotracheale complicata
- d) prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale





7 Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?

- a) La bocca
- b) gli occhi
- c) il polso carotideo
- d) la risposta alla chiamata o allo stimolo doloroso

8 Durante un'aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto::

- a) sospendere la somministrazione di ossigeno
- b) aspirare almeno per 4 minuti
- c) aspirare durante l'introduzione della sonda
- d) aspirare durante la rimozione della sonda

9 In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani?

- a) prima di una qualsiasi procedura
- b) prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso
- c) prima del contatto diretto con un paziente
- d) dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano

10 Per ridurre le complicanze correlate alla somministrazione per via intramuscolare, tra cui il dolore e il reflusso di farmaci irritanti a livello del sottocute , è opportuno:

- a) utilizzare la zona deltoidea
- b) eseguire la tecnica Z (Z-track)
- c) utilizzare la zona del retto femorale
- d) inserire l'ago con un angolo di 90°

11 Per la determinazione del residuo urinario è indispensabile:

- a) far bere al paziente almeno 2 litri di acqua nelle 24 ore prima della valutazione
non far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
- b) applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore
- c) far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
- d) far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere

12 Quale insieme di attività realizzeresti prioritariamente nel programmare l'assistenza durante il turno di notte?

- a) presa visione dei pazienti meno complessi
- b) presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il comfort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici
- c) presa visione della sola documentazione sanitaria
- d) monitoraggio pazienti critici





13 Secondo le più recenti linee guida del BLS, le mani per le compressioni toraciche in caso di massaggio cardiaco vanno posizionate:

- a) sul terzo inferiore del torace, appoggiate sullo sterno
- b) sul terzo superiore del torace, appoggiate sullo sterno
- c) sul centro del torace, appoggiate sullo sterno
- d) sullo sterno, a due dita dal processo xifoideo

14 Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ?

- a) dorso del piede e caviglia, tallone, trocantere, malleolo
- b) orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
- c) orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
- d) orecchio, gomito, polso, trocantere, malleolo

15 Durante l'assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, non è un comportamento corretto:

- a) sostituire periodicamente il set di drenaggio
- b) sollevare in alto il contenitore di raccolta (Bulau) per valutare la quantità e la qualità del materiale drenato
- c) clampare il tubo di drenaggio pleurico
- d) declampare il tubo di drenaggio pleurico

16 Nell'esecuzione dell'ECG, l'elettrodo per la derivazione precordiale V6 va posizionato:

- a) nel decimo spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
- b) nel quinto spazio intervertebrale sinistro, sulla linea emiclaveare
- c) nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare media
- d) nella zona occipitale

17 La manovra di Lesser viene utilizzata:

- a) in caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree
- b) introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
- c) per la riduzione manuale di fratture prossimali dell'omero
- d) durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico

18 Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale va sempre eseguito in posizione:

- a) supina
- b) prona
- c) supina con testa e collo immobilizzati
- d) semiortopnoica



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

19 Qual è l'approccio più corretto nella gestione dello shock ?

- a) riconoscere rapidamente i primi sintomi, sostenere le funzioni vitali, identificare precocemente la causa primaria, correggere la causa e gestire le complicanze
- b) non intervenire con alcun trattamento terapeutico prima dell'identificazione della causa primaria
- c) tenere un atteggiamento di vigile attesa fino al manifestarsi delle prime complicanze, che andranno allora prontamente trattate
- d) limitarsi ad un trattamento sintomatico per evitare i danni da ipoperfusione

20 Quale tra le seguenti misure terapeutiche è preferibile nel trattamento d'urgenza di una emorragia venosa dell'arto inferiore?

- a) applicazione di un laccio a valle rispetto alla sede del sanguinamento
- b) pressione diretta sulla sede della lesione senza guanti
- c) applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
- d) esposizione chirurgica del vaso



PROVA A (PRATICA)

1 Per aiutare un paziente con laparotomia addominale ad espettorare le secrezioni è maggiormente utile:

- a) fargli assumere la posizione laterale
- b) fargli assumere la posizione prona e invitarlo a tossire con decisione e a contenere la lesione
- c) invitarlo a tossire tenendo il capo flesso verso il basso
- d) associare la posizione semiseduta a respiri profondi e colpi di tosse invitandolo a contenersi la lesione**

2 Se il monitor cardiaco va in allarme si deve:

- a) verificare i collegamenti e valutare clinicamente il paziente**
- b) vedere il colorito cutaneo del paziente e rilevare il polso femorale
- c) togliere gli elettrodi
- d) spegnere gli allarmi

3 Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:

- a) controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni**
- b) controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
- c) controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
- d) controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

4 La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:

- a) con garze non sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- b) con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- c) con garze sterili percorrendo la linea di sutura da sinistra a destra e viceversa per più volte
- d) con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari**

5 L'infermiere sta assistendo un paziente positivo per epatite A. Cosa dovrebbe fare l'infermiere?

- a) indossare un camice monouso quando entra nella stanza del paziente
- b) prestare attenzione quando consegna gli alimenti al paziente
- c) utilizzare i guanti quando cambia la biancheria del letto del paziente**
- d) indossare una mascherina

6 Il test di Allen va eseguito:

- a) prima del posizionamento di un catetere venoso centrale (CVC) nella vena succlavia
- b) dopo il posizionamento di un catetere vescicale
- c) dopo l'intubazione endotracheale complicata
- d) prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale**

7 Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?

- a) La bocca
- b) gli occhi
- c) il polso carotideo
- d) la risposta alla chiamata o allo stimolo doloroso**

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

8 Durante un'aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto::

- a) sospendere la somministrazione di ossigeno
- b) aspirare almeno per 4 minuti
- c) aspirare durante l'introduzione della sonda
- d) aspirare durante la rimozione della sonda**

9 In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani?

- a) prima di una qualsiasi procedura
- b) prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso**
- c) prima del contatto diretto con un paziente
- d) dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano

10 Per ridurre le complicanze correlate alla somministrazione per via intramuscolare, tra cui il dolore e il reflusso di farmaci irritanti a livello del sottocute, è opportuno:

- a) utilizzare la zona deltoidea
- b) eseguire la tecnica Z (Z-track)**
- c) utilizzare la zona del retto femorale
- d) inserire l'ago con un angolo di 90°

11 Per la determinazione del residuo urinario è indispensabile:

- a) far bere al paziente almeno 2 litri di acqua nelle 24 ore prima della valutazione
- b) non far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
- c) applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore
- d) far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere**



12 Quale insieme di attività realizzeresti prioritariamente nel programmare l'assistenza durante il turno di notte?

- a) presa visione dei pazienti meno complessi
- b) presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il comfort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici**
- c) presa visione della sola documentazione sanitaria
- d) monitoraggio pazienti critici

13 Secondo le più recenti linee guida del BLS, le mani per le compressioni toraciche in caso di massaggio cardiaco vanno posizionate:

- a) sul terzo inferiore del torace, appoggiate sullo sterno
- b) sul terzo superiore del torace, appoggiate sullo sterno
- c) sul centro del torace, appoggiate sullo sterno**
- d) sullo sterno, a due dita dal processo xifoideo

14 Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ?

- a) dorso del piede e caviglia, tallone, trocantere, malleolo
- b) orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
- c) orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo**
- d) orecchio, gomito, polso, trocantere, malleolo

15 Durante l'assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, non è un comportamento corretto:

- a) sostituire periodicamente il set di drenaggio
- b) sollevare in alto il contenitore di raccolta (Bulau) per valutare la quantità e la qualità del materiale drenato**
- c) clampare il tubo di drenaggio pleurico
- d) declampare il tubo di drenaggio pleurico



16 Nell'esecuzione dell'ECG, l'elettrodo per la derivazione precordiale V6 va posizionato:

- a) nel decimo spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
- b) nel quinto spazio intervertebrale sinistro, sulla linea emiclaveare
- c) nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare media**
- d) nella zona occipitale

17 La manovra di Lesser viene utilizzata:

- a) in caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree
- b) introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
- c) per la riduzione manuale di fratture prossimali dell'omero
- d) durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico**

18 Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale va sempre eseguito in posizione:

- a) supina
- b) prona
- c) supina con testa e collo immobilizzati**
- d) semiortopnoica

19 Qual è l'approccio più corretto nella gestione dello shock ?

- a) riconoscere rapidamente i primi sintomi, sostenere le funzioni vitali, identificare precocemente la causa primaria, correggere la causa e gestire le complicanze**
- b) non intervenire con alcun trattamento terapeutico prima dell'identificazione della causa primaria
- c) tenere un atteggiamento di vigile attesa fino al manifestarsi delle prime complicanze, che andranno allora prontamente trattate
- d) limitarsi ad un trattamento sintomatico per evitare i danni da ipoperfusione

20 Quale tra le seguenti misure terapeutiche è preferibile nel trattamento d'urgenza di una emorragia venosa dell'arto inferiore?

- a) applicazione di un laccio a valle rispetto alla sede del sanguinamento**
- b) pressione diretta sulla sede della lesione senza guanti
- c) applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
- d) esposizione chirurgica del vaso

Angela Celi 8/10/2021
 PROVA ESTIMATA

Antonio M... 9/10/2021
 PROVA ESTIMATA

PROVA B (PRATICA)

1 Secondo le raccomandazioni per la sicurezza del paziente sottoposto a intervento chirurgico, il "time out" corrisponde alla fase:

- a) Al prericovero, prima dell'ingresso in reparto
- b) tra la fine del risveglio del paziente e l'uscita dalla sala operatoria
- c) tra la fine dell'intervento e le suture delle fasce muscolari e cutanee
- d) dopo l'induzione dell'anestesia e prima dell'incisione chirurgica

2 Le precauzioni standard prevedono l'impiego dei guanti monouso in quale situazione?

- a) quando è previsto il contatto con le mucose, la cute non integra e i fluidi organici tranne il sudore
- b) quando si indossa la divisa all'inizio del turno
- c) quando è previsto il contatto con il paziente
- d) quando è previsto il contatto con gli oggetti utilizzati per il paziente

3 Qual è l'intervento infermieristico prioritario per un paziente nell'immediato post operatorio?

- a) aprire le finestre della stanza
- b) osservare la comparsa di emorragie
- c) mantenere la pervietà delle vie aeree
- d) preparare il vassoio del pasto.

4 Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:

- a) edemi declivi e turgore delle vene giugulari
- b) poliuria
- c) episodi di ipotensione ortostatica
- d) inversione del ritmo sonno veglia

5 Per quanto tempo può essere sospesa la manovra di rianimazione cardio polmonare?

- a) 1 minuto
- b) 3 minuti
- c) 10 secondi
- d) mai

6 Quali sono gli interventi da attuare in caso di reazione alla trasfusione?

- a) interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare sacca e set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio di trasfusione per gli accertamenti
- b) rallentare la somministrazione,
- c) interrompere la somministrazione, avvisare il medico
- d) rallentare la somministrazione, avvisare il medico per impostare una terapia, inviare sacca e set al servizio trasfusionale per gli accertamenti





7 Quando è indicato il lavaggio antisettico delle mani ?

- a) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
- b) prima di eseguire procedure invasive
- c) come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria
- d) al termine delle attività di strumentazione peri-operatoria

8 In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:

- a) eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi
- b) pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
- c) utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
- d) pungere dopo avere accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungere

9 Tra le seguenti alternative indicare la prassi che l'infermiere deve osservare per una corretta identificazione del paziente:

- a) rivolgersi al paziente chiamandolo per nome e cognome e chiedere conferma dell'identità
- b) leggere nome, cognome e data di nascita del paziente sulla documentazione clinica e confrontarlo con quanto riportato sulla termografica al letto del paziente
- c) chiamare ad alta voce il paziente per nome e cognome guardandolo in volto e verificando corrispondenza identità con il cartellino posto ai piedi del letto
- d) rivolgersi al paziente chiedendogli di dire il proprio nome, cognome e data di nascita

10 L'infermiere garantisce la corretta procedura per la somministrazione dei farmaci mediante:

- a) la regola delle 7G
- b) il controllo della prescrizione del farmaco
- c) la registrazione dell'avvenuta somministrazione
- d) l'accertamento del nome del farmaco, il dosaggio e il rispetto delle via di somministrazione

11 La rilevazione della pressione arteriosa in clinostatismo e ortostatismo è indicata:

- a) dopo un prolungato allettamento
- b) nell'immediato post operatorio
- c) prima della somministrazione dei farmaci antipertensivi
- d) dopo un decubito obbligato a letto di 24 ore

12 Per instillare delle gocce auricolari in un paziente adulto occorre:

- a) sollevare la pinna del padiglione auricolare in alto e in fuori
- b) non fare trazioni sul padiglione auricolare
- c) tirare verso il basso il padiglione auricolare
- d) inclinare in avanti la testa del paziente





13 Un paziente è in difficoltà nell'uso dello spirometro incentivante. Nell'insegnamento al paziente, quale delle seguenti viene indicata dall'infermiere come un'azione che può interferire con l'uso efficace dello spirometro?

- a) respirare attraverso il naso
- b) stringere le labbra attorno al boccaglio
- c) togliere il boccaglio per espirare
- d) tutte le precedenti

14 Quale sede è consigliata per la somministrazione di vaccini e immunoglobuline tramite l'iniezione intramuscolare?

- a) vastolaterale
- b) deltoidea
- c) ventroglutea
- d) dorsoglutea

15 Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro:

- a) lasciarlo a letto con le spondine
- b) è utile pianificare ,solo per il tempo necessario , interventi di tutela, individualizzati e riguardanti della dignità umana, da parte dell'intera equipe professionale
- c) è indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi per la sua qualità di vita
- d) chiedere ai famigliari di rimanere in reparto sempre

16 Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, le compressioni toraciche devono :

- a) avere frequenza di 120 compressioni al minuto
- b) non ci sono compressioni toraciche
- c) a discrezione del soccorritore
- d) abbassare il torace di 5-6 cm

17 Quale azione infermieristica è importante durante l'aspirazione delle secrezioni ad un paziente con tracheostomia?

- a) iniziare l'aspirazione quando il catetere viene ritirato
- b) non si aspira mai un paziente con tracheotomia
- c) l'infermiere non può aspirare un paziente tracheostomizzato
- d) far rilassare il paziente mettendo della musica

18 Quale è il provvedimento da intraprendere in caso di diarrea acuta in un bambino di due anni in buone condizioni cliniche?

- a) reidratare con soluzioni glucoelettrolitiche per via orale
- b) prescrivere il digiuno per almeno 8 ore
- c) sospendere tutti gli alimenti per 12 ore poi iniziare una dieta in bianco
- d) sospendere l'assunzione di caramelle



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

19 Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?

- a) mezza compressa
- b) due compresse
- c) una compressa più mezza
- d) secondo indicazione medica

20 Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:

- a) quando l'infermiere ha tempo
- b) durante un episodio di aumento della temperatura corporea
- c) solo se la temperatura corporea supera i 40°C
- d) a digiuno

PROVA B (PRATICA)

1 Secondo le raccomandazioni per la sicurezza del paziente sottoposto a intervento chirurgico, il "time out" corrisponde alla fase:

- a) Al prericovero, prima dell'ingresso in reparto
- b) tra la fine del risveglio del paziente e l'uscita dalla sala operatoria
- c) tra la fine dell'intervento e le suture delle fasce muscolari e cutanee
- d) **dopo l'induzione dell'anestesia e prima dell'incisione chirurgica**

2 Le precauzioni standard prevedono l'impiego dei guanti monouso in quale situazione?

- a) **quando è previsto il contatto con le mucose, la cute non integra e i fluidi organici tranne il sudore**
- b) quando si indossa la divisa all'inizio del turno
- c) quando è previsto il contatto con il paziente
- d) quando è previsto il contatto con gli oggetti utilizzati per il paziente

3 Qual è l'intervento infermieristico prioritario per un paziente nell'immediato post operatorio?

- a) aprire le finestre della stanza
- b) **osservare la comparsa di emorragie**
- c) **mantenere la pervietà delle vie aeree**
- d) preparare il vassoio del pasto.

4 Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:

- a) **edemi declivi e turgore delle vene giugulari**
- b) poliuria
- c) episodi di ipotensione ortostatica
- d) inversione del ritmo sonno veglia

5 Per quanto tempo può essere sospesa la manovra di rianimazione cardio polmonare?

- a) 1 minuto
- b) 3 minuti
- c) **10 secondi**
- d) **mai**

6 Quali sono gli interventi da attuare in caso di reazione alla trasfusione?

- a) **interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare sacca e set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio di trasfusione per gli accertamenti**
- b) rallentare la somministrazione,
- c) interrompere la somministrazione, avvisare il medico
- d) rallentare la somministrazione, avvisare il medico per impostare una terapia, inviare sacca e set al servizio trasfusionale per gli accertamenti

7 Quando è indicato il lavaggio antisettico delle mani ?

- a) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
- b) prima di eseguire procedure invasive
- c) come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria
- d) al termine delle attività di strumentazione peri-operatoria

8 In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:

- a) eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi
- b) pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
- c) utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
- d) pungere dopo avere accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungere

9 Tra le seguenti alternative indicare la prassi che l'infermiere deve osservare per una corretta identificazione del paziente:

- a) rivolgersi al paziente chiamandolo per nome e cognome e chiedere conferma dell'identità
- b) leggere nome, cognome e data di nascita del paziente sulla documentazione clinica e confrontarlo con quanto riportato sulla termografica al letto del paziente
- c) chiamare ad alta voce il paziente per nome e cognome guardandolo in volto e verificando corrispondenza identità con il cartellino posto ai piedi del letto
- d) rivolgersi al paziente chiedendogli di dire il proprio nome, cognome e data di nascita

10 L'infermiere garantisce la corretta procedura per la somministrazione dei farmaci mediante:

- a) la regola delle 7G
- b) il controllo della prescrizione del farmaco
- c) la registrazione dell'avvenuta somministrazione
- d) l'accertamento del nome del farmaco, il dosaggio e il rispetto delle vie di somministrazione

11 La rilevazione della pressione arteriosa in clinostatismo e ortostatismo è indicata:

- a) dopo un prolungato allettamento
- b) nell'immediato post operatorio
- c) prima della somministrazione dei farmaci antipertensivi
- d) dopo un decubito obbligato a letto di 24 ore

12 Per instillare delle gocce auricolari in un paziente adulto occorre:

- a) sollevare la pinna del padiglione auricolare in alto e in fuori
- b) non fare trazioni sul padiglione auricolare
- c) tirare verso il basso il padiglione auricolare
- d) inclinare in avanti la testa del paziente



13 Un paziente è in difficoltà nell'uso dello spirometro incentivante. Nell'insegnamento al paziente, quale delle seguenti viene indicata dall'infermiere come un'azione che può interferire con l'uso efficace dello spirometro?

- a) respirare attraverso il naso
- b) stringere le labbra attorno al bocaglio
- c) togliere il bocaglio per espirare
- d) tutte le precedenti

14 Quale sede è consigliata per la somministrazione di vaccini e immunoglobuline tramite l'iniezione intramuscolare?

- a) vastolaterale
- b) deltoidea
- c) ventroglutea
- d) dorsoglutea

15 Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro:

- a) lasciarlo a letto con le spondine
- b) è utile pianificare ,solo per il tempo necessario , interventi di tutela, individualizzati e riguardosi della dignità umana, da parte dell'intera equipe professionale
- c) è indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi per la sua qualità di vita
- d) chiedere ai famigliari di rimanere in reparto sempre

16 Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, le compressioni toraciche devono :

- a) avere frequenza di 120 compressioni al minuto
- b) non ci sono compressioni toraciche
- c) a discrezione del soccorritore
- d) abbassare il torace di 5-6 cm

17 Quale azione infermieristica è importante durante l'aspirazione delle secrezioni ad un paziente con tracheostomia?

- a) iniziare l'aspirazione quando il catetere viene ritirato
- b) non si aspira mai un paziente con tracheotomia
- c) l'infermiere non può aspirare un paziente tracheostomizzato
- d) far rilassare il paziente mettendo della musica

18 Quale è il provvedimento da intraprendere in caso di diarrea acuta in un bambino di due anni in buone condizioni cliniche?

- a) reidratare con soluzioni glucoelettrolitiche per via orale
- b) prescrivere il digiuno per almeno 8 ore
- c) sospendere tutti gli alimenti per 12 ore poi iniziare una dieta in bianco
- d) sospendere l'assunzione di caramelle

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

19 Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?

- a) mezza compressa
- b) due compresse
- c) una compressa più mezza
- d) secondo indicazione medica

20 Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:

- a) quando l'infermiere ha tempo
- b) durante un episodio di aumento della temperatura corporea
- c) solo se la temperatura corporea supera i 40°C
- d) a digiuno

Giulio Guarni / M... 9/10/2021

PROVA NON ESTRATTA

9/10/2021

PROVA non ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Nord Milano

PROVA C (PRATICA)

1 Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ?

- a) dorso del piede e caviglia, tallone, trocantere, malleolo
- b) tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
- c) orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
- d) orecchio, gomito, polso, trocantere, malleolo

2 Qual' è l'azione più corretta qualora si rompesse accidentalmente una fiala contenente un farmaco stupefacente?

- a) si scarica il farmaco registrandolo a nome del paziente che ne fa uso
- b) si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell'apposito registro
- c) non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato
- d) si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico

3 In caso di shock ipovolemico non emorragico qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?

- a) prona
- b) Trendelenburg
- c) supina
- d) semi-seduta

4 Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?

- a) invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina nel corso della giornata
- b) invitare il paziente a raccogliere tutta l'urinasterile
- c) invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
- d) invitare il paziente a raccogliere l'urina dell'ultima minzione della sera,

5 Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne. Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?

- a) In base alle simpatie dell'infermiere
- b) paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita
- c) paziente in dimissione il giorno dopo
- d) in base al Cognome del paziente



6 La tecnica di iniezione intradermica prevede l'inserimento dell'ago con un'angolazione:

- a) compresa fra 45° e 90°
- b) di 30°
- c) di 90°
- d) compresa fra 10° e 15°

7 Scegliere fra i seguenti possibili interventi assistenziali, quelli che permettono di ridurre il dolore correlato all'iniezione intramuscolare:

- a) non è possibile ridurre il dolore
- b) mettere delle garze calde-umide nella sede d'iniezione
- c) cambiare l'ago dopo aver aspirato il farmaco da un flacone monodose o multidose ed utilizzare la tecnica Z
- d) usare ghiaccio spray dopo l'iniezione

8 Durante la manovra di rianimazione cardio respiratoria, NON è corretto:

- a) iniziare la rianimazione a partire dalle compressioni toraciche
- b) controllare preventivamente la carta d'identità del paziente
- c) considerare il gasping come attività respiratoria
- d) assicurarsi che ci siano famigliari del paziente

9 L'infermiere trova a terra vicino al suo letto un paziente privo di coscienza. Interviene:

- a) mettendolo a letto, chiamando il medico di guardia e compilando la denuncia di caduta accidentale
- b) correndo subito a chiamare aiuto
- c) eseguendo una prima valutazione delle condizioni del paziente senza spostarlo, poi chiamando auto
- d) preoccupandosi di reperire il carrello delle urgenze e poi chiamando aiuto

10 Durante la rilevazione della pressione arteriosa agli arti inferiori, il fonendoscopio va posto a livello dell'arteria:

- a) radiale
- b) pedidia
- c) poplitea
- d) circonflessa anteriore

11 Nell'ambito del trattamento delle lesioni da pressione, in presenza di un'escara stabile e senza eritema perilesionale localizzata sui talloni è indicato:

- a) non effettuare nulla
- b) chiamare il medico
- c) fala effettuare dall'Oss
- d) favorire la mummificazione per disidratazione dell'escara





12 La corretta dimensione della cannula orofaringea viene determinata in base alla distanza tra:

- a) angolo del naso ed osso occipitale
- b) angolo dell'orecchio e palpebra
- c) angolo della bocca e punta del lobo dell'orecchio
- d) incisura intercricioidea e punta del naso

13 L'infermiere di medicina trasfusionale nell'ambito delle proprie competenze può:

- a) procedere alla terapia trasfusionale in presenza del medico o quando è facilmente reperibile
- b) impostare trattamenti terapeutici senza l'autorizzazione o le disposizioni del medico
- c) procedere a trattamenti terapeutici anche in assenza del medico
- d) procedere alla terapia trasfusionale in presenza dell'Oss

14 Dopo un prelievo di midollo effettuato sulla cresta iliaca:

- a) si effettua una prolungata compressione
- b) si applica una medicazione semplice
- c) si applica una pomata antibiotica
- d) si pratica un lieve massaggio

15 Un paziente con catetere vescicale per ritenzione urinaria riferisce fastidio al livello della vescica e dell'uretra. Cosa dovrebbe fare l'infermiere prioritariamente?

- a) spremere leggermente il catetere
- b) controllare la pervietà del catetere
- c) irrigare il catetere con soluzioni prescritte
- d) sostituire il catetere vescicale

16 Prima di somministrare la terapia attraverso il sondino naso-gastrico l'infermiere :

- a) non effettua valutazioni
- b) valuta che il sondino sia posizionato correttamente, valuta la possibilità di frantumare o aprire le capsule, lava il sondino con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione
- c) delega tale attività all'Oss
- d) effettua tale attività solo in presenza del medico

17 Nella somministrazione di farmaci per via orale a un paziente disfagico, non possono essere polverizzati o triturati:

- a) nessun farmaco può essere triturato
- b) i farmaci gastroresistenti
- c) in base alle scelte del paziente
- d) possono essere triturati solo i farmaci somministrati alle ore 20.00



18 Il "punto zero" per la rilevazione della PVC (PRESSIONE VENOSA CENTRALE) si ricerca:


- a) all'altezza dell'articolazione scapolo-omerale
- b) all'altezza dell'articolazione temporo-mandibolare
- c) all'altezza della linea ascellare inferiore
- d) all'altezza della linea ascellare media

19 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla procedura del lavaggio chirurgico delle mani, NON è esatta?

- a) il lavaggio deve iniziare dalle punta delle dita
- b) il lavaggio comprende gli avambracci
- c) durante il lavaggio possono essere mantenuti anelli e monili
- d) si può utilizzare uno spazzolino monouso imbibito di antisettico

20 Quale delle seguenti affermazioni relative alla somministrazione sottocutanea di eparina è falsa?

- a) la sede di iniezione non va massaggiata
- b) va eseguita sull'addome ma può essere praticata anche su cosce o braccia
- c) vanno utilizzati aghi da 10 mm, 25 o 26 Gauge
- d) bisogna necessariamente eseguire la manovra di Lesser



PROVA C (PRATICA)

1 Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ?

- a) dorso del piede e caviglia, tallone, trocantere, malleolo
- b) tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
- c) orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo**
- d) orecchio, gomito, polso, trocantere, malleolo

2 Qual' è l'azione più corretta qualora si rompesse accidentalmente una fiala contenente un farmaco stupefacente?

- a) si scarica il farmaco registrandolo a nome del paziente che ne fa uso
- b) si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell'apposito registro**
- c) non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato
- d) si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico

3 In caso di shock ipovolemico non emorragico qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?

- a) prona
- b) Trendelenburg**
- c) supina
- d) semi-seduta

4 Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?

- a) invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina nel corso della giornata
- b) invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina sterile
- c) invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile**
- d) invitare il paziente a raccogliere l'urina dell'ultima minzione della sera,

5 Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne. Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?

- a) In base alle simpatie dell'infermiere
- b) paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita**
- c) paziente in dimissione il giorno dopo
- d) in base al Cognome del paziente

6 La tecnica di iniezione intradermica prevede l'inserimento dell'ago con un'angolazione:

- a) compresa fra 45° e 90°
- b) di 30°
- c) di 90°
- d) compresa fra 10° e 15°

7 Scegliere fra i seguenti possibili interventi assistenziali, quelli che permettono di ridurre il dolore correlato all'iniezione intramuscolare:

- a) non è possibile ridurre il dolore
- b) mettere delle garze calde-umide nella sede d'iniezione
- c) cambiare l'ago dopo aver aspirato il farmaco da un flacone monodose o multidose ed utilizzare la tecnica Z
- d) usare ghiaccio spray dopo l'iniezione

8 Durante la manovra di rianimazione cardio respiratoria, NON è corretto:

- a) iniziare la rianimazione a partire dalle compressioni toraciche
- b) controllare preventivamente la carta d'identità del paziente
- c) considerare il gasping come attività respiratoria
- d) assicurarsi che ci siano famigliari del paziente

9 L'infermiere trova a terra vicino al suo letto un paziente privo di coscienza. Interviene:

- a) mettendolo a letto, chiamando il medico di guardia e compilando la denuncia di caduta accidentale
- b) correndo subito a chiamare aiuto
- c) eseguendo una prima valutazione delle condizioni del paziente senza spostarlo, poi chiamando auto
- d) preoccupandosi di reperire il carrello delle urgenze e poi chiamando aiuto

10 Durante la rilevazione della pressione arteriosa agli arti inferiori, il fonendoscopio va posto a livello dell'arteria:

- a) radiale
- b) pedidia
- c) poplitea
- d) circonflessa anteriore

11 Nell'ambito del trattamento delle lesioni da pressione, in presenza di un'escara stabile e senza eritema perilesionale localizzata sui talloni è indicato:

- a) non effettuare nulla
- b) chiamare il medico
- c) fala effettuare dall'Oss
- d) favorire la mummificazione per disidratazione dell'escara

12 La corretta dimensione della cannula orofaringea viene determinata in base alla distanza tra:

- a) angolo del naso ed osso occipitale
- b) angolo dell'orecchio e palpebra
- c) **angolo della bocca e punta del lobo dell'orecchio**
- d) incisura intercricioidea e punta del naso

13 L'infermiere di medicina trasfusionale nell'ambito delle proprie competenze può:

- a) **procedere alla terapia trasfusionale in presenza del medico o quando è facilmente reperibile**
- b) impostare trattamenti terapeutici senza l'autorizzazione o le disposizioni del medico
- c) procedere a trattamenti terapeutici anche in assenza del medico
- d) procedere alla terapia trasfusionale in presenza dell'Oss

14 Dopo un prelievo di midollo effettuato sulla cresta iliaca:

- a) **si effettua una prolungata compressione**
- b) si applica una medicazione semplice
- c) si applica una pomata antibiotica
- d) si pratica un lieve massaggio

15 Un paziente con catetere vescicale per ritenzione urinaria riferisce fastidio al livello della vescica e dell'uretra. Cosa dovrebbe fare l'infermiere prioritariamente?

- a) spremere leggermente il catetere
- b) **controllare la pervietà del catetere**
- c) irrigare il catetere con soluzioni prescritte
- d) sostituire il catetere vescicale

16 Prima di somministrare la terapia attraverso il sondino naso-gastrico l'infermiere :

- a) non effettua valutazioni
- b) **valuta che il sondino sia posizionato correttamente, valuta la possibilità di frantumare o aprire le capsule, lava il sondino con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione**
- c) delega tale attività all'Oss
- d) effettua tale attività solo in presenza del medico

17 Nella somministrazione di farmaci per via orale a un paziente disfagico, non possono essere polverizzati o triturati:

- a) nessun farmaco può essere triturato
- b) **i farmaci gastroresistenti**
- c) in base alle scelte del paziente
- d) possono essere triturati solo i farmaci somministrati alle ore 20.00

18 Il "punto zero" per la rilevazione della PVC (PRESSIONE VENOSA CENTRALE) si ricerca:

- a) all'altezza dell'articolazione scapolo-omerale
- b) all'altezza dell'articolazione temporo-mandibolare
- c) all'altezza della linea ascellare inferiore
- d) **all'altezza della linea ascellare media**

19 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla procedura del lavaggio chirurgico delle mani, NON è esatta?

- a) il lavaggio deve iniziare dalle punta delle dita
- b) il lavaggio comprende gli avambracci
- c) **durante il lavaggio possono essere mantenuti anelli e monili**
- d) si può utilizzare uno spazzolino monouso imbibito di antisettico

20 Quale delle seguenti affermazioni relative alla somministrazione sottocutanea di eparina è falsa?

- a) la sede di iniezione non va massaggiata
- b) va eseguita sull'addome ma può essere praticata anche su cosce o braccia
- c) vanno utilizzati aghi da 10 mm, 25 o 26 Gauge
- d) **bisogna necessariamente eseguire la manovra di Lesser**

29/10/21 

Prova A

1. Il candidato descriva il ruolo dell'infermiere di famiglia e di comunità.
2. Che cosa significa zippare un file?
3. Translate these questions: Which drugs cannot be shredded? What is the correct way to shred drugs?



29/10/21



Prova C

1. Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) e intervenire (azioni infermieristiche) in caso di paziente in arresto cardio circolatorio.
2. Che cos'è Google?
3. Translate this question: Which are the most frequent nursing care needs in surgery?




Tab non estratta

02/11/2021

MP

Prova A

1. Il candidato esponga le misure preventive, secondo le raccomandazioni ministeriali, che un infermiere deve attuare per evitare l'errore nella somministrazione della terapia.
2. Che cos'è l'Hardware?
3. Translate these question: When did you have the last headache?
Which drugs did you take?



2/11/2021

TURNO II


Prova B

1. Il candidato esponga le responsabilità dell'infermiere nella gestione del catetere venoso periferico.
2. Che cos'è il JPEG?
3. Translate this sentence: The pap test is a cytological test (removing cells) very useful to diagnose early cancer and pre-cancerous lesions of the cervix



PROVA SCRITTA
2 NOVEMBRE 2021
TURNO h. 8 00



Prova C

1. Il candidato descriva come identificare la persona a rischio di lesioni da pressione ed indichi le possibili azioni infermieristiche per prevenire le lesioni da pressione in questa tipologia di pazienti.
2. Definizione di desktop.
3. Translate this sentence: Respiratory infections often cause epistaxis (nosebleed).



PROVA ESTERNA 2/11/2021
TURNO 14:30

due Masini

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Nord Milano

PROVA D

1. Il candidato descriva l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).
2. Cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?
3. Vomiting could be a sign of indigestion.



Prova non estratta

02/11/2021

MS

Prova E

1. Il candidato descriva la responsabilità dell'infermiere nella gestione delle soluzioni elettrolitiche concentrate per uso endovenoso.
2. Che cos'è Homepage?
3. The causes that determine an epistaxis (nosebleed) can be divided into factors.



PROVA ESTRATTA
5/11/2021 TURNO 18⁰⁰
Claudio Dina

Prova A

1. Il candidato descriva il ruolo dell'infermiere nella fase di dimissione del paziente.
2. Che cosa significa Logout?
3. Translate this question: Is A.B.G. (Arterial Blood Gas) analysis a test to assess the patient's ventilatory status?



Prova B

PROVA ESTRAIUTA
5/11/2021
TURNO h. 14.30 *Saverio
Rozzi*

1. Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) ed assistere (azioni infermieristiche) un paziente in coma ipoglicemico.
2. A cosa serve il programma Excel ?
3. Translate this sentence: Performing a nuclear medicine exam involves administering a radioactive substance.



frase non estratta
05/11/2021
[Signature]

Prova C

1. Il candidato descriva la gestione del paziente con sospetta malattia infettiva trasmissibile da contatto.
2. Cosa si intende per SPAM?
3. Translate this sentence: The appearance of pressure ulcers is not linked to a single cause but there are several factors that contribute to the onset.



PROVA STRATA

5/11/21

TURNO H 11:00
[Signature]

Prova D

1. Il candidato esponga quali sono le misure preventive che l'infermiere deve attuare per evitare l'insorgenza delle lesioni da pressione.
2. Che cos'è il software?
3. Translate this sentence: Before giving the drug to the patient, the nurse must correctly identify him.



Trabone Straltes
MoV

Prova E

1. Il candidato descriva come riconoscere (segni e sintomi) e assistere (azioni infermieristiche) un paziente in stato di shock emorragico.
2. Che cosa indica il termine "PROVIDER"?
3. Hemorrhage refers to the blood loss of the bloodstream.

