

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano	FOGLIO INFORMATIVO CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO DA 75 g (OGTT)	Rev. 0	Pag. 1 di 1
	LAB-FI-024		

CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT)

La **curva da carico orale di glucosio (OGTT)** è un test funzionale per lo studio del metabolismo degli zuccheri. E' utilizzato per la diagnosi di diabete gestazionale tra la 24° e 28° settimana di gravidanza. E' indicato anche nel sospetto di diabete mellito non diagnosticabile dal valore della glicemia a digiuno.

Norme da rispettare:

- Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, ma da non più di 14 ore.
- Rimanere **seduti a riposo** in Centro Prelievi, non mangiare o fumare.
- Rimanere a **digiuno** fino al termine del test. Dopo circa 15' dal termine dell'assunzione della soluzione glucidica è possibile assumere dell'acqua naturale.

L'esame prevede un prelievo per la glicemia basale, in base alla quale si valuta l'idoneità all'esecuzione dell'esame, l'assunzione di 75g di glucosio in soluzione (secondo le forniture della farmacia in uso al momento) e successivi prelievi venosi ad orari prestabiliti:

- Donna in gravidanza: 3 prelievi ai tempi 0' (basale), 60' e 120'.
- Tutti gli altri casi 2 prelievi ai tempi 0' (basale) e 120'
- In caso di associazione di dosaggio seriato di insulina/c-peptide al carico di glucosio, la curva glicemica deve rispettare i punti della curva insulinemica/c-peptide ai tempi 0', 30', 60', 90', 120', (180') (curva a 6 punti)

A tale procedura diagnostica possono essere connessi alcuni effetti collaterali quali: nausea/vomito, reazioni allergiche ed, eccezionalmente, broncospasmo per la presenza nello sciroppo di para-idrossibenzoati.

Gentile utente la preghiamo di compilare il seguente modulo

Io sottoscritto/a..... Genitore/legale rappresentante del/la paziente.....

Nato/a a..... il...../...../.....

Dichiaro di essere stato indirizzato al Laboratorio Analisi per l'esecuzione di alcune indagini:

- Utili a meglio comprendere la natura di alcuni disturbi accusati e attribuiti in prima ipotesi a un sospetto di malattia da intolleranza ai glucidi/diabetica.
- Utili a studiare l'evoluzione della malattia da cui sono da tempo affetto.
- Utili per il controllo della gravidanza

Ultimo valore di glucosio riscontrato:.....mg/dL, eseguito in data.....(non superiore a 30 giorni).

Assunzione di farmaci, allergie riferite.....

Firma del paziente

Firma dell'operatore che somministra il glucosio

Data.....