


Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	FOGLIO INFORMATIVO URINOCOLTURA	Rev.0	Pag. 1 di 1
			DSD-ALAB-FI-007

URINOCOLTURA (Esame colturale dell'urina da mitto intermedio)

La raccolta del campione deve avvenire il mattino del giorno della consegna, raccogliendo preferibilmente le prime urine del mattino o almeno dopo 2 ore dall'ultima minzione.

1. Raccogliere sterilmente le urine in un contenitore sterile a bocca larga per urinocoltura:
 - lavare mani e genitali esterni con sapone (non disinfettanti) e asciugare
 - aprire il contenitore sterile a bocca larga per urinocoltura, evitando di toccarne le pareti
 - per le donne divaricare le grandi labbra, per gli uomini retrarre il prepuzio
 - scartare il primo getto di urina, raccogliere direttamente nel contenitore sterile il secondo getto (mitto intermedio) avendo cura di non riempirlo eccessivamente. Consegnare al Centro Prelievi il giorno stesso della raccolta

2. Se dotati di tampone Uriswab fornito dal Centro Prelievi, dopo la raccolta delle urine:
 - aprire il tappo a vite della provetta Uriswab senza toccare la spugna sterile
 - immergere la spugna per 10 secondi nell'urina raccolta nel contenitore sterile da urinocoltura fino a saturazione della spugnetta
 - reinserire la spugna nella provetta e chiudere bene il tappo a vite. Consegnare la provetta Uriswab al Centro Prelievi.



3. In alternativa il campione può essere raccolto urinando direttamente sul tampone Uriswab fino a saturazione della spugna, sempre rispettando le regole igieniche sopra riportate e dopo aver eliminato il primo getto. In tal caso assicurarsi che la spugna sia ben bagnata di urina, senza toccarla con le dita.

NOTA : NON riempire la provetta Uriswab con l'urina

NOTA : in caso di utilizzo delle stesse urine (unico barattolo sterile) per urinocoltura ed esame chimico-fisico delle urine, prima eseguire il prelievo con tampone Uriswab per urinocoltura, poi travasare le urine nella provetta per esame urine.

Il contenitore sterile + tampone Uriswab sono forniti gratuitamente dal Centro Prelievi dietro presentazione di richiesta medica. Alternativamente il barattolo sterile a bocca larga può essere acquistato esternamente, ad es. in Farmacia.